

Klasyfikacja TNM

T - guz pierwotny	
T1	Guz niejawny klinicznie, nie stwierdzany na podstawie badania palpacyjnego i badań obrazowych
T1a	Guz wykryty na podstawie badania histopatologicznego w 5% lub mniej wyciętej tkanki stercza
T1b	Guz wykryty na podstawie badania histopatologicznego w >5% wyciętej tkanki stercza
T1c	Guz rozpoznany na podstawie biopsji igłowej (wykonanej np. z powodu podwyższonego stężenia PSA w surowicy)
T2	Guz ograniczony do stercza
T2a	Zajęcie połowy jednego płata lub mniej
T2b	Zajęcie więcej niż połowy jednego płata stercza, ale nie obu płatów
T2c	Zajęcie obydwu płatów stercza
T3	Guz naciekający poza torebkę stercza
T3a	Naciekanie pozatorebkowe (jedno lub obustronne) łącznie z mikroskopowym zajęciem szyi pęcherza moczowego
T3b	Naciekanie pęcherzyków nasiennych
T4	Guz nieruchomy lub naciekanie okolicznych tkanek innych niż pęcherzyki nasienne: zwieracza zewnętrznego cewki moczowej, odbytnicy, mięśnia dźwigacza odbytu i /lub ściany miednicy
N	
Regionalne węzły	
N0	Nie stwierdza się przerzutów w regionalnych węzłach chłonnych
N1	Przerzuty w regionalnych węzłach chłonnych
M	
Przerzuty odległe	
M0	Nie stwierdza się przerzutów odległych
M1	Przerzuty odległe
M1a	Przerzut(y) w jednym lub wielu pozaregionalnych węzłach chłonnych
M1b	Przerzut(y) do kości
M1c	Przerzut(y) o innym umiejscowieniu