

Stopnie zaawansowania klinicznego	
Stopień 0	Tak zwany <i>carcinoma in situ</i> , guz otoczony torebką, nie nacieka. Stadium przedinwazyjne.
Stopień IA	Niewielki guz nienaciekający błony mięśniowej, ale docierający do błony podśluzowej.
Stopień IB	Guz nacieka błonę mięśniową.
Stopień IIA	Guz jest coraz większy, dochodzi już do granic narządu i nacieka błonę otaczającą przełyk.
Stopień IIB	Guz niewielki, dochodzący maksymalnie do błony mięśniowej, jak w stopniu IB, ale dodatkowo stwierdza się zmiany w 1-2 regionalnych węzłach chłonnych.
Stopień IIIA	Guz albo coraz bardziej się rozrasta, naciekając sąsiednie struktury, takie jak przepona czy opłucna, bądź zajętych jest coraz więcej węzłów chłonnych.
Stopień IIIB	Guz nacieka błonę otaczającą przełyk i dodatkowo zajętych jest kilka węzłów chłonnych.
Stopień IIIC	Oznacza nacieki sąsiednich narządów z zajęciem co najmniej 3 węzłów chłonnych albo powyżej 7, nawet przy mniejszych rozmiarach guza.
Stopień IV	Występują przerzuty odległe. Rozmiar guza i nacieki węzłów chłonnych nie ma znaczenia.