

Ostre białaczki szpikowe z powtarzalnymi zmianami cytogenetycznymi

OBSz z t(8;21)(q22;q22); *RUNX-1-RUNX1T1*

Obsz z inv(16)(p13.1q22)

lub t(16;16)(p13.1;q22); *CBFB-MYH11*

Ostra białaczka promielocytowa z t(15;17)(q22;q12); *PML-RARA*

OBSz z t(9;11)(p22;q23); *MLLT3-MLL*

OBSz z t(6;9)(p23;q34); *DEK-NUP214*

OBSz z inv(3)(q21q26.2) lub t(3;3)(q21;q26.2); *RPN1-EV11*

OBSz(megakarioblastyczna) z t(1;22)(p13;q13); *RBM15-MKLI*

OBSz z mutacją NPM1

OBSz z mutacją CEBP

OBSz ze zmianami związanymi z mielodysplazją

Nowotwory mieloidalne związane z wcześniejszym leczeniem(chemioterapią i/lub radioterapią)

OBSz NOS(nie sklasyfikowane w inny sposób)

OBSz z minimalnym różnicowaniem

OBSz bez dojrzewania

OBSz z dojrzewaniem

Ostra białaczka mielomonocytowa

Ostra białaczka monoblastyczna i monocytowa

Ostra białaczka erytroidalna

Ostra białaczka megakarioblastyczna

Ostra białaczka zasadochłonna

Ostra panmieloza z mielofibrozą

Mięsak mieloidalny

Prolifracje mieloidalne związane z zespołem Down'a

Ostre białaczki z mieszanymi cechami liniowymi(nieznacznie, OBSz z t(9;22), fenotyp mieszany B+mieloidalny, T+mieloidalny)