


Białaczka limfatyczna (C91) w Polsce w 2023


	Zachorowalność			Umieralność		
	Mężczyźni	Kobiety	Obie płcie	Mężczyźni	Kobiety	Obie płcie
Liczba przypadków	1 472	1 143	2 615	594	497	1 091
Współczynnik surowy*	8,1	5,9	6,9	3,3	2,6	2,9
ESP2013*	9,3	5,5	7,1	4,3	2,3	3,1
ASW*	5,4	3,5	4,4	1,7	0,8	1,2
Ryzyko skumulowane (do 79 lat)*	0,7%	0,4%	0,6%	0,3%	0,1%	0,2%

Zachorowalność


Zróznicowanie geograficzne wg województw (ESP2013)




Odsetek wśród wszystkich nowotworów złośliwych



Trendy czasowe w latach 1999-2023




Zachorowalność wg grup wieku




Umieralność


Zróżnicowanie geograficzne wg województw (ESP2013)




Odsetek wśród wszystkich nowotworów złośliwych



Trendy czasowe w latach 1999-2023



Umieralność wg grup wieku



Czynniki zwiększające ryzyko białaczki limfatycznej:

- ekspozycja na promieniowanie jonizujące,
- kontakt z benzenem i niektórymi pestycydami,
- przebyta chemioterapia (wtórne białaczki),
- zaburzenia układu odpornościowego,
- przyczyny rozwoju ostrej białaczki limfoblastycznej pozostają nieznane.



e-mail:

KRN.instytut@nio.gov.pl

strona:

<https://onkologia.org.pl/pl>

* <https://onkologia.org.pl/pl/informacje-o-danych-i-slownik-pojec>