


## Chłoniak nie-Hodgkina (C82–C86, C96) w Polsce w 2023


|                                 | Zachorowalność |         |            | Umieralność |         |            |
|---------------------------------|----------------|---------|------------|-------------|---------|------------|
|                                 | Mężczyźni      | Kobiety | Obie płcie | Mężczyźni   | Kobiety | Obie płcie |
| Liczba przypadków               | 2 027          | 1 965   | 3 992      | 939         | 815     | 1 754      |
| Współczynnik surowy*            | 11,1           | 10,1    | 10,6       | 5,2         | 4,2     | 4,7        |
| ESP2013*                        | 12,6           | 9,3     | 10,6       | 6,4         | 3,8     | 4,8        |
| ASW*                            | 6,6            | 5,1     | 5,7        | 2,6         | 1,5     | 2,0        |
| Ryzyko skumulowane (do 79 lat)* | 0,9%           | 0,7%    | 0,8%       | 0,4%        | 0,3%    | 0,3%       |

### Zachorowalność


#### Zróźnicowanie geograficzne wg województw (ESP2013)




#### Odsetek wśród wszystkich nowotworów złośliwych



#### Trendy czasowe w latach 1999-2023




#### Zachorowalność wg grup wieku




## Umieralność


### Zróżnicowanie geograficzne wg województw (ESP2013)




### Odsetek wśród wszystkich nowotworów złośliwych



### Trendy czasowe w latach 1999-2023



### Umieralność wg grup wieku



### Czynniki zwiększające ryzyko chłoniaków nie-Hodgkina:

- płeć - dwa razy wyższe ryzyko raka u mężczyzn,
- infekcje wirusowe (EBV, HIV, HCV, HTLV-1),
- choroby autoimmunologiczne,
- leczenie immunosupresyjne (np. po przeszczepach),
- wiek: ryzyko zachorowania na chłoniaki nieziarnicze rośnie wraz z wiekiem.



**e-mail:**  
[KRN.institut@nio.gov.pl](mailto:KRN.institut@nio.gov.pl)  
**strona:**  
<https://onkologia.org.pl/pl>

\* <https://onkologia.org.pl/pl/informacje-o-danych-i-slownik-pojec>