


Nowotwór kości i chrząstek stawowych (C40–C41) w Polsce w 2023


	Zachorowalność			Umieralność		
	Mężczyźni	Kobiety	Obie płcie	Mężczyźni	Kobiety	Obie płcie
Liczba przypadków	229	188	417	154	136	290
Współczynnik surowy*	1,3	1,0	1,1	0,8	0,7	0,8
ESP2013*	1,3	0,9	1,1	1,0	0,6	0,8
ASW*	1,2	0,8	1,0	0,5	0,4	0,4
Ryzyko skumulowane (do 79 lat)*	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,1%

Zachorowalność


Zróżnicowanie geograficzne wg województw (ESP2013)




Odsetek wśród wszystkich nowotworów złośliwych



Trendy czasowe w latach 1999-2023




Zachorowalność wg grup wieku




Umieralność


Zróżnicowanie geograficzne wg województw (ESP2013)




Odsetek wśród wszystkich nowotworów złośliwych



Trendy czasowe w latach 1999-2023



Umieralność wg grup wieku



Czynniki zwiększające ryzyko nowotworu kości i chrząstki stawowej:

- wiek – ryzyko zachorowania jest większe w okresie dojrzewania. Drugi szczyt zachowań przypada po piątej dekadzie życia,
- płeć – osteosarcoma częściej występuje u mężczyzn,
- wzrost – dzieci chorujące na osteosarcoma są przeważnie wyższe niż ich rówieśnicy.



e-mail:

KRN.instytut@nio.gov.pl

strona:

<https://onkologia.org.pl/pl>

* <https://onkologia.org.pl/pl/informacje-o-danych-i-slownik-pojec>