


Międzybłoniak i nowotwór tkanek miękkich (C45–C49) w Polsce w 2023


	Zachorowalność			Umieralność		
	Mężczyźni	Kobiety	Obie płcie	Mężczyźni	Kobiety	Obie płcie
Liczba przypadków	912	820	1 732	599	546	1 145
Współczynnik surowy*	5,0	4,2	4,6	3,3	2,8	3,0
ESP2013*	5,6	4,0	4,6	4,0	2,6	3,1
ASW*	3,3	2,6	2,9	1,8	1,3	1,5
Ryzyko skumulowane (do 79 lat)*	0,4%	0,3%	0,4%	0,3%	0,2%	0,2%

Zachorowalność


Zróżnicowanie geograficzne wg województw (ESP2013)




Odsetek wśród wszystkich nowotworów złośliwych



Trendy czasowe w latach 1999-2023




Zachorowalność wg grup wieku




Umieralność


Zróżnicowanie geograficzne wg województw (ESP2013)




Odsetek wśród wszystkich nowotworów złośliwych



Trendy czasowe w latach 1999-2023



Umieralność wg grup wieku



Czynniki zwiększające ryzyko międzybłoniaka i nowotworów tkanek miękkich:

- narażenie na azbest,
- wcześniejsza radioterapia z powodu innego nowotworu,
- ekspozycja na substancje chemiczne, takie jak chlorek winylu czy arsen,
- niektóre zespoły genetyczne.



e-mail:

KRN.instytut@nio.gov.pl

strona:

<https://onkologia.org.pl/pl>

* <https://onkologia.org.pl/pl/informacje-o-danych-i-slownik-pojec>