


Nowotwór pęcherza moczowego (C67) w Polsce w 2023


	Zachorowalność			Umieralność		
	Mężczyźni	Kobiety	Obie płcie	Mężczyźni	Kobiety	Obie płcie
Liczba przypadków	5 398	1 841	7 239	2 997	992	3 989
Współczynnik surowy*	29,6	9,4	19,2	16,5	5,1	10,6
ESP2013*	35,9	8,5	19,4	22,1	4,5	11,1
ASW*	14,0	3,6	8,0	7,2	1,5	3,8
Ryzyko skumulowane (do 79 lat)*	2,6%	0,7%	1,5%	1,2%	0,3%	0,7%

Zachorowalność


Zróźnicowanie geograficzne wg województw (ESP2013)




Odsetek wśród wszystkich nowotworów złośliwych



Trendy czasowe w latach 1999-2023




Zachorowalność wg grup wieku




Umieralność


Zróźnicowanie geograficzne wg województw (ESP2013)




Odsetek wśród wszystkich nowotworów złośliwych



Trendy czasowe w latach 1999-2023



Umieralność wg grup wieku



Czynniki zwiększające ryzyko pęcherza moczowego:

- palenie papierosów – 50-65% przypadków wśród mężczyzn i 20-30% przypadków wśród kobiet,
- ekspozycja na niektóre chemikalia stosowane w przemyśle (dotyczy pracowników przemysłu tekstylnego, gumowego, skórzanego, drukarskiego i chemicznego),
- przewlekłe drażnienie (kamica pęcherza moczowego, długotrwałe stosowanie cewników oraz nawracające, przewlekłe stany zapalne dróg moczowych)



e-mail:
KRN.instytut@nio.gov.pl
strona:
<https://onkologia.org.pl/pl>

* <https://onkologia.org.pl/pl/informacje-o-danych-i-slownik-pojec>