


Nowotwór pęcherzyka żółciowego (C23) w Polsce w 2023


	Zachorowalność			Umieralność		
	Mężczyźni	Kobiety	Obie płcie	Mężczyźni	Kobiety	Obie płcie
Liczba przypadków	150	405	555	157	459	616
Współczynnik surowy*	0,8	2,1	1,5	0,9	2,4	1,6
ESP2013*	1,0	1,9	1,5	1,1	2,1	1,7
ASW*	0,4	0,8	0,6	0,4	0,9	0,6
Ryzyko skumulowane (do 79 lat)*	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,2%	0,1%

Zachorowalność


Zróźnicowanie geograficzne wg województw (ESP2013)




Odsetek wśród wszystkich nowotworów złośliwych



Trendy czasowe w latach 1999-2023




Zachorowalność wg grup wieku




Umieralność


Zróżnicowanie geograficzne wg województw (ESP2013)




Odsetek wśród wszystkich nowotworów złośliwych



Trendy czasowe w latach 1999-2023



Umieralność wg grup wieku



Czynniki zwiększające ryzyko nowotworu pęcherzyka żółciowego:

- kamica (w polskiej populacji jest to głównie kamica cholesterolowa), którą stwierdza się u 75-90% chorych z rakiem pęcherzyka,
- przewlekły odczyn zapalny błony śluzowej pęcherzyka,
- otyłość.



e-mail:
KRN.instytut@nio.gov.pl
strona:
<https://onkologia.org.pl/pl>