


Nowotwór przełyku (C15) w Polsce w 2023


	Zachorowalność			Umieralność		
	Mężczyźni	Kobiety	Obie płcie	Mężczyźni	Kobiety	Obie płcie
Liczba przypadków	1 077	365	1 442	1 197	359	1 556
Współczynnik surowy*	5,9	1,9	3,8	6,6	1,8	4,1
ESP2013*	6,4	1,7	3,8	7,3	1,6	4,1
ASW*	3,2	0,8	1,9	3,5	0,7	2,0
Ryzyko skumulowane (do 79 lat)*	0,5%	0,1%	0,3%	0,6%	0,1%	0,3%

Zachorowalność


Zróznicowanie geograficzne wg województw (ESP2013)




Odsetek wśród wszystkich nowotworów złośliwych



Trendy czasowe w latach 1999-2023




Zachorowalność wg grup wieku




Umieralność


Zróżnicowanie geograficzne wg województw (ESP2013)




Odsetek wśród wszystkich nowotworów złośliwych



Trendy czasowe w latach 1999-2023



Umieralność wg grup wieku



Czynniki zwiększające ryzyko nowotworu przełyku:

- wiek,
- nowotwory przełyku częściej występują po 55. roku życia,
- picie wysokoprocentowego alkoholu oraz palenie i żucie tytoniu,
- otyłość i stan po radioterapii śródpiersia,
- czynniki dietetyczne: niedobory witamin, oparzenia gorącymi potrawami, spożywanie ostrych przypraw i nieświeżych pokarmów zanieczyszczonych grzybami pleśniowymi.
- oparzenia gorącymi potrawami oraz regularne picie bardzo gorących napojów (powyżej 65°C), co prowadzi do przewlekłego drażnienia i stanów zapalnych błony śluzowej.



e-mail:
KRN.institut@nio.gov.pl
strona:
<https://onkologia.org.pl/pl>