


Nowotwór wargi, jamy ustnej i gardła (C00–C14) w Polsce w 2023


	Zachorowalność			Umieralność		
	Mężczyźni	Kobiety	Obie płcie	Mężczyźni	Kobiety	Obie płcie
Liczba przypadków	3 147	1 335	4 482	2 293	797	3 090
Współczynnik surowy*	17,3	6,9	11,9	12,6	4,1	8,2
ESP2013*	18,3	6,3	11,7	13,8	3,7	8,2
ASW*	10,0	3,3	6,5	7,0	1,7	4,1
Ryzyko skumulowane (do 79 lat)*	1,5%	0,5%	0,9%	1,1%	0,3%	0,6%

Zachorowalność


Zróźnicowanie geograficzne wg województw (ESP2013)




Odsetek wśród wszystkich nowotworów złośliwych



Trendy czasowe w latach 1999-2023




Zachorowalność wg grup wieku




Umieralność


Zróżnicowanie geograficzne wg województw (ESP2013)




Odsetek wśród wszystkich nowotworów złośliwych



Trendy czasowe w latach 1999-2023



Umieralność wg grup wieku



Czynniki zwiększające ryzyko nowotworu wargi, jamy ustnej i gardła:

- drażnienie błon śluzowych dymem papierosowym i wysokoprocentowym alkoholem,
- zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV),
- ekspozycja słoneczna w przypadku nowotworu wargi,
- przewlekłe mechaniczne drażnienie śluzówek poprzez źle dopasowane protezy lub ukruszone zęby,
- dieta uboga w warzywa i owoce.



e-mail:
KRN.instytut@nio.gov.pl
strona:
<https://onkologia.org.pl/pl>

* <https://onkologia.org.pl/pl/informacje-o-danych-i-slownik-pojec>