Krajowy Rejestr Nowotworów


Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy

Chłoniak Hodgkina (C81) w Polsce w 2024


	Zachorowalność			Umieralność		
	Mężczyźni	Kobiety	Obie płcie	Mężczyźni	Kobiety	Obie płcie
Liczba przypadków	423	438	861	78	50	128
Współczynnik surowy*	2,3	2,3	2,3	0,4	0,3	0,3
ESP2013*	2,3	2,3	2,3	0,5	0,2	0,3
ASW*	2,3	2,4	2,4	0,2	0,1	0,2
Ryzyko skumulowane (do 79 lat)*	0,2%	0,2%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%

Zachorowalność


Zróżnicowanie geograficzne wg województw (ESP2013)




Odsetek wśród wszystkich nowotworów złośliwych



Trendy czasowe w latach 1999-2024




Zachorowalność wg grup wieku




Umieralność


Zróżnicowanie geograficzne wg województw (ESP2013)




Odsetek wśród wszystkich nowotworów złośliwych



Trendy czasowe w latach 1999-2024



Umieralność wg grup wieku



Czynniki zwiększające ryzyko chłoniaka Hodgkina:

- infekcje wirusowe (EBV, HIV, HCV, HTLV-1),
- choroby autoimmunologiczne,
- leczenie immunosupresyjne (np. po przeszczepach),
- Chłoniak Hodgkina charakteryzuje się tzw. dwufazowym szczytem zachorowań – najczęściej diagnozuje się go u młodych dorosłych (między 15. a 35. rokiem życia) oraz u osób starszych, powyżej 55. roku życia.

e-mail:
KRN.instytut@nio.gov.pl

strona:
https://onkologia.org.pl/pl

* https://onkologia.org.pl/pl/informacje-o-danych-i-slownik-pojec

© 2026 Krajowy Rejestr Nowotworów