Krajowy Rejestr Nowotworów


Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy

Nowotwór jelita grubego (C18–C21) w Polsce w 2024


	Zachorowalność			Umieralność		
	Mężczyźni	Kobiety	Obie płcie	Mężczyźni	Kobiety	Obie płcie
Liczba przypadków	11 491	9 092	20 583	7 054	5 356	12 410
Współczynnik surowy*	63,3	46,8	54,8	38,9	27,6	33,0
ESP2013*	71,9	41,8	54,0	48,2	24,2	33,6
ASW*	31,2	19,5	24,5	17,8	9,2	12,8
Ryzyko skumulowane (do 79 lat)*	5,4%	3,2%	4,1%	3,0%	1,5%	2,2%

Zachorowalność


Zróżnicowanie geograficzne wg województw (ESP2013)




Odsetek wśród wszystkich nowotworów złośliwych



Trendy czasowe w latach 1999-2024




Zachorowalność wg grup wieku




Umieralność


Zróżnicowanie geograficzne wg województw (ESP2013)




Odsetek wśród wszystkich nowotworów złośliwych



Trendy czasowe w latach 1999-2024



Umieralność wg grup wieku



Czynniki zwiększające ryzyko nowotworu jelita grubego:

- wiek powyżej 50. roku życia,
- dieta ubogobłonnikowa, bogatotłuszczowa, wysokokaloryczna, uboga w wapń,
- spożywanie alkoholu, palenie tytoniu,
- zespół metaboliczny (nadciśnienie, otyłość, cukrzyca, hipertriglicerydemia, niski HDL),
- choroby zapalne jelit w przeszłości,
- brak aktywności fizycznej, siedzący tryb życia.

Zalecenie: Wykonywanie kolonoskopii przesiewowej po 50. roku życia (lub wcześniej przy obciążeniu rodzinnym).

e-mail:
KRN.instytut@nio.gov.pl

strona:
https://onkologia.org.pl/pl

* https://onkologia.org.pl/pl/informacje-o-danych-i-slownik-pojec

© 2026 Krajowy Rejestr Nowotworów