Krajowy Rejestr Nowotworów


Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy

Nowotwór pęcherza moczowego (C67) w Polsce w 2024


	Zachorowalność			Umieralność		
	Mężczyźni	Kobiety	Obie płcie	Mężczyźni	Kobiety	Obie płcie
Liczba przypadków	5 033	1 655	6 688	3 151	1 004	4 155
Współczynnik surowy*	27,7	8,5	17,8	17,4	5,2	11,1
ESP2013*	33,1	7,4	17,6	23,0	4,5	11,3
ASW*	12,5	3,1	7,1	7,3	1,5	3,8
Ryzyko skumulowane (do 79 lat)*	2,4%	0,6%	1,4%	1,3%	0,3%	0,7%

Zachorowalność


Zróżnicowanie geograficzne wg województw (ESP2013)




Odsetek wśród wszystkich nowotworów złośliwych



Trendy czasowe w latach 1999-2024




Zachorowalność wg grup wieku




Umieralność


Zróżnicowanie geograficzne wg województw (ESP2013)




Odsetek wśród wszystkich nowotworów złośliwych



Trendy czasowe w latach 1999-2024



Umieralność wg grup wieku



Czynniki zwiększające ryzyko pęcherza moczowego:

- palenie papierosów – 50-65% przypadków wśród mężczyzn i 20-30% przypadków wśród kobiet,
- ekspozycja na niektóre chemikalia stosowane w przemyśle (dotyczy pracowników przemysłu tekstylnego, gumowego, skórzanego, drukarskiego i chemicznego),
- przewlekłe drażnienie (kamica pęcherza moczowego, długotrwałe stosowanie cewników oraz nawracające, przewlekłe stany zapalne dróg moczowych)

e-mail:
KRN.instytut@nio.gov.pl

strona:
https://onkologia.org.pl/pl

* https://onkologia.org.pl/pl/informacje-o-danych-i-slownik-pojec

© 2026 Krajowy Rejestr Nowotworów