
Nowotwór pęcherzyka żółciowego (C23) w Polsce w 2024


	Zachorowalność			Umieralność		
	Mężczyźni	Kobiety	Obie płcie	Mężczyźni	Kobiety	Obie płcie
Liczba przypadków	168	506	674	145	462	607
Współczynnik surowy*	0,9	2,6	1,8	0,8	2,4	1,6
ESP2013*	1,1	2,3	1,8	0,9	2,1	1,6
ASW*	0,4	1,0	0,7	0,4	0,9	0,6
Ryzyko skumulowane (do 79 lat)*	0,1%	0,2%	0,1%	0,1%	0,2%	0,1%

Zachorowalność


Zróżnicowanie geograficzne wg województw (ESP2013)




Odsetek wśród wszystkich nowotworów złośliwych



Trendy czasowe w latach 1999-2024




Zachorowalność wg grup wieku




Umieralność


Zróżnicowanie geograficzne wg województw (ESP2013)




Odsetek wśród wszystkich nowotworów złośliwych



Trendy czasowe w latach 1999-2024



Umieralność wg grup wieku



Czynniki zwiększające ryzyko nowotworu pęcherzyka żółciowego:

- kamica (w polskiej populacji jest to głównie kamica cholesterolowa), którą stwierdza się u 75-90% chorych z rakiem pęcherzyka,
- przewlekły odczyn zapalny błony śluzowej pęcherzyka,
- otyłość.

e-mail:
KRN.instytut@nio.gov.pl

strona:
https://onkologia.org.pl/pl

* https://onkologia.org.pl/pl/informacje-o-danych-i-slownik-pojec

© 2026 Krajowy Rejestr Nowotworów