
Nowotwór wargi, jamy ustnej i gardła (C00–C14) w Polsce w 2024


	Zachorowalność			Umieralność		
	Mężczyźni	Kobiety	Obie płcie	Mężczyźni	Kobiety	Obie płcie
Liczba przypadków	3 639	1 533	5 172	2 245	788	3 033
Współczynnik surowy*	20,1	7,9	13,8	12,4	4,1	8,1
ESP2013*	21,0	7,2	13,4	13,3	3,6	7,9
ASW*	11,4	3,9	7,4	6,8	1,6	4,0
Ryzyko skumulowane (do 79 lat)*	1,7%	0,6%	1,1%	1,0%	0,3%	0,6%

Zachorowalność


Zróżnicowanie geograficzne wg województw (ESP2013)




Odsetek wśród wszystkich nowotworów złośliwych



Trendy czasowe w latach 1999-2024




Zachorowalność wg grup wieku




Umieralność


Zróżnicowanie geograficzne wg województw (ESP2013)




Odsetek wśród wszystkich nowotworów złośliwych



Trendy czasowe w latach 1999-2024



Umieralność wg grup wieku



Czynniki zwiększające ryzyko nowotworu wargi, jamy ustnej i gardła:

- drażnienie błon śluzowych dymem papierosowym i wysokoprocentowym alkoholem,
- zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV),
- ekspozycja słoneczna w przypadku nowotworu wargi,
- przewlekłe mechaniczne drażnienie śluzówek poprzez źle dopasowane protezy lub ukruszone zęby,
- dieta uboga w warzywa i owoce.

e-mail:
KRN.instytut@nio.gov.pl

strona:
https://onkologia.org.pl/pl

* https://onkologia.org.pl/pl/informacje-o-danych-i-slownik-pojec

© 2026 Krajowy Rejestr Nowotworów