



CHŁONIAK HODGKINA - 2019


Arkusz informacyjny

Zachorowalność


	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
Liczba przypadków w roku 2019	365	334	699
Współczynnik surowy	2.0	1.7	1.8
Współczynnik standaryzowany (ASE)	2.0	1.7	1.8
Ryzyko skumulowane (do 74 lat)	1 z 69771	1 z 78121	-
Odsetek wśród wszystkich nowotworów złośliwych	0.4%	0.4%	0.4%
Prognozowana liczba przypadków w roku 2024	305	328	633
Prognozowany współczynnik standaryzowany (ASE) dla 2024	1.6	1.7	1.7



Zachorowania, mężczyźni





Zachorowania, kobiety




Umieralność




	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
Liczba przypadków w roku 2019	89	84	173
Współczynnik surowy	0.5	0.4	0.5
Współczynnik standaryzowany (ASE)	0.5	0.4	0.5
Ryzyko skumulowane (do 74 lat)	1 z 288752	1 z 309506	-
Odsetek wśród wszystkich nowotworów złośliwych	0.2%	0.2%	0.2%
Prognozowana liczba przypadków w roku 2024	60	52	112
Prognozowany współczynnik standaryzowany (ASE) dla 2024	0.3	0.2	0.3



Zgony, mężczyźni




Zgony, kobiety




Arkusz informacyjny


Zachorowalność wg płci




Współczynnik surowy




Umieralność wg płci




Współczynnik surowy



Zachorowalność według płci (współczynnik standaryzowany ASE)



Współczynnik standaryzowany (ASE)



Czynniki zwiększające ryzyko chłoniaka Hodgkina:

- infekcje zakaźne w młodym wieku,
- niedobory odporności (zakażenie HIV, osoby poddane leczeniu immunosupresyjnemu po przeszczepach narządów),
- zakażenie wirusem EBV.

