



NOWOTWÓR KRTANI - 2019


Arkusz informacyjny

Zachorowalność


	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
Liczba przypadków w roku 2019	1688	265	1953
Współczynnik surowy	9.1	1.3	5.1
Współczynnik standaryzowany (ASE)	10.2	1.3	5.1
Ryzyko skumulowane (do 74 lat)	1 z 14731	1 z 109130	-
Odsetek wśród wszystkich nowotworów złośliwych	2.0%	0.3%	1.1%
Prognozowana liczba przypadków w roku 2024	1733	336	2069
Prognozowany współczynnik standaryzowany (ASE) dla 2024	9.7	1.5	5.1



Zachorowania, mężczyźni





Zachorowania, kobiety




Umieralność




	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
Liczba przypadków w roku 2019	1267	191	1458
Współczynnik surowy	6.8	1.0	3.8
Współczynnik standaryzowany (ASE)	7.9	0.9	3.9
Ryzyko skumulowane (do 74 lat)	1 z 19769	1 z 170621	-
Odsetek wśród wszystkich nowotworów złośliwych	2.3%	0.4%	1.5%
Prognozowana liczba przypadków w roku 2024	1332	215	1547
Prognozowany współczynnik standaryzowany (ASE) dla 2024	7.8	0.9	3.9




Zgony, mężczyźni




Zgony, kobiety



Współczynnik standaryzowany (ASE)




Współczynnik surowy




Umieralność wg płci


Współczynnik standaryzowany (ASE)




Współczynnik surowy



Zachorowalność według płci
(współczynnik standaryzowany ASE)



Współczynnik standaryzowany (ASE)



Czynniki zwiększające ryzyko nowotworu krtani:

- narażenie na dym papierosowy,
- spożywanie alkoholu (synergistyczne działanie z dymem papierosowym),
- narażenie na pył drzewny czy węglowy oraz wziewne substancje chemiczne.

więcej na:

