

MIĘDZYBŁONIAK I NOWOTWÓR TKANEK MIĘKKICH - 2019



Arkusz informacyjny




KRAJOWY REJESTR
NOWOTWORÓW

Zachorowalność


	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
Liczba przypadków w roku 2019	862	691	1553
Współczynnik surowy	4.6	3.5	4.0
Współczynnik standaryzowany (ASE)	5.4	3.4	4.2
Ryzyko skumulowane (do 74 lat)	1 z 31178	1 z 44846	-
Odsetek wśród wszystkich nowotworów złośliwych	1%	0.8%	0.9%
Prognozowana liczba przypadków w roku 2024	964	685	1639
Prognozowany współczynnik standaryzowany (ASE) dla 2024	5.6	3.2	4.2



Zachorowania, mężczyźni





Zachorowania, kobiety




Umieralność




	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
Liczba przypadków w roku 2019	567	494	1061
Współczynnik surowy	3.1	2.5	2.8
Współczynnik standaryzowany (ASE)	3.8	2.4	3.0
Ryzyko skumulowane (do 74 lat)	1 z 49508	1 z 72731	-
Odsetek wśród wszystkich nowotworów złośliwych	1%	1.1%	1.1%
Prognozowana liczba przypadków w roku 2024	810	623	1433
Prognozowany współczynnik standaryzowany (ASE) dla 2024	4.9	2.8	3.8



Zgony, mężczyźni



Zgony, kobiety





MIĘDZYBŁONIAK I NOWOTWÓR TKANEK MIĘKKICH - 2019

Arkusz informacyjny



Zachorowalność wg płci

Współczynnik standaryzowany (ASE)




Umieralność wg płci


Współczynnik standaryzowany (ASE)



Zachorowalność według płci (współczynnik standaryzowany ASE)



Współczynnik standaryzowany (ASE)



Czynniki zwiększające ryzyko międzybłoniaka i nowotworów tkanek miękkich:

- narażenie na azbest,
- wcześniejsza radioterapia z powodu innego nowotworu,
- ekspozycja na substancje chemiczne, takie jak chlorek winylu czy arsen,
- niektóre zespoły genetyczne.

