

Stopień zróżnicowania histologicznego (G)

GX — nie można ocenić stopnia zróżnicowania.

G1 — dobrze zróżnicowany.

G2 — umiarkowanie zróżnicowany.

G3 — niskozróżnicowany lub niezróżnicowany.

Ognisko pierwotne (T)

TX — nie można ocenić guza pierwotnego.

T0 — brak dowodów na istnienie ogniska pierwotnego.

T1 — największa średnica ≤ 5 cm.

T1a — umiejscowienie całkowicie nad powięzią powierzchowną (nie wrastając w nią).

T1b — umiejscowienie pod powięzią powierzchowną (lub wrastanie w nią).

T2 — największa średnica guza > 5 cm.

T2a — umiejscowienie całkowicie nad powięzią powierzchowną (nie wrastając w nią).

T2b — umiejscowienie pod powięzią powierzchowną (lub wrastanie w nią).

Mięsaki przestrzeni zaotrzewnowej, śródpiersia i miednicy zalicza się do guzów głębokich określa się jako b (T1b/T2b).

Regionalne węzły chłonne (N)

NX — nie można ocenić regionalnych węzłów chłonnych.

N0 — regionalne węzły chłonne bez przerzutów.

N1 — obecne przerzuty do regionalnych węzłów chłonnych.

Przerzuty odległe (M):

MX — nie można ocenić przerzutów odległych.

M0 — brak przerzutów odległych.

M1 — przerzuty odległe.

Stopnie zaawansowania klinicznego AJCC/TNM

Stopień I: G1, T dowolne, N0, M0.

Stopień II: G2-3, T1a,b lub G2T2a,b, N0, M0.

Stopień III: G3, T2a,b, N0, M0 lub każdy G, każdy T, N1, M0.

Stopień IV: G dowolne, T dowolne, N1 i lub M1.