



NOWOTWÓR OKRĘŻNICY - 2019


Arkusze informacyjne

Zachorowalność


	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
Liczba przypadków w roku 2019	5802	5043	10845
Współczynnik surowy	31.2	25.4	28.3
Współczynnik standaryzowany (ASE)	39.8	24.3	30.4
Ryzyko skumulowane (do 74 lat)	1 z 4948	1 z 7735	-
Odsetek wśród wszystkich nowotworów złośliwych	6.8%	5.9%	6.3%
Prognozowana liczba przypadków w roku 2024	6154	7747	13901
Prognozowany współczynnik standaryzowany (ASE) dla 2024	27.1	47.1	35.0



Zachorowania, mężczyźni





Zachorowania, kobiety




Umieralność




	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
Liczba przypadków w roku 2019	4331	3537	7868
Współczynnik surowy	23.3	17.8	20.5
Współczynnik standaryzowany (ASE)	32.3	16.9	22.7
Ryzyko skumulowane (do 74 lat)	1 z 7999	1 z 14984	-
Odsetek wśród wszystkich nowotworów złośliwych	8.0%	7.7%	7.8%
Prognozowana liczba przypadków w roku 2024	5306	3964	9270
Prognozowany współczynnik standaryzowany (ASE) dla 2024	35.3	17.2	24.0



Zgony, mężczyźni




Zgony, kobiety




Arkusz informacyjny

Zachorowalność wg płci

Współczynnik standaryzowany (ASE)




Współczynnik surowy




Umieralność wg płci


Współczynnik standaryzowany (ASE)




Współczynnik surowy



Zachorowalność według płci (współczynnik standaryzowany ASE)



Współczynnik standaryzowany (ASE)



Czynniki zwiększające ryzyko nowotworu okrężnicy:

- wiek, ryzyko zachorowania na nowotwór rośnie po 50. roku życia,
- zespół metaboliczny (nadciśnienie, otyłość, cukrzyca, hipertriglicerydemia, niski HDL) – wzrost ryzyka głównie u mężczyzn; im więcej spełnionych kryteriów zespołu metabolicznego, tym większe ryzyko zachorowania,
- dieta ubogobłonnikowa, bogatotłuszczowa, wysokokaloryczna, uboga w wapń,
- spożywanie alkoholu, palenie tytoniu.

więcej na:



<http://onkologia.org.pl>