



# NOWOTWÓR OKRĘŻNICY I ZGIĘCIA ESICZEGO - 2019


Arkusz informacyjny

## Zachorowalność


|                                                         | Mężczyźni | Kobiety  | Ogółem |
|---------------------------------------------------------|-----------|----------|--------|
| Liczba przypadków w roku 2019                           | 6744      | 5721     | 12465  |
| Współczynnik surowy                                     | 36.3      | 28.9     | 32.5   |
| Współczynnik standaryzowany (ASE)                       | 46.0      | 27.6     | 34.8   |
| Ryzyko skumulowane (do 74 lat)                          | 1 z 4244  | 1 z 6198 | -      |
| Odsetek wśród wszystkich nowotworów złośliwych          | 7.9%      | 6.7%     | 7.3%   |
| Prognozowana liczba przypadków w roku 2024              | 9141      | 7107     | 16248  |
| Prognozowany współczynnik standaryzowany (ASE) dla 2024 | 55.3      | 31.3     | 40.9   |



## Zachorowania, mężczyźni





## Zachorowania, kobiety




## Umieralność




|                                                         | Mężczyźni | Kobiety   | Ogółem |
|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| Liczba przypadków w roku 2019                           | 4767      | 3830      | 8597   |
| Współczynnik surowy                                     | 25.7      | 19.3      | 22.4   |
| Współczynnik standaryzowany (ASE)                       | 35.4      | 18.3      | 24.8   |
| Ryzyko skumulowane (do 74 lat)                          | 1 z 7197  | 1 z 13683 | -      |
| Odsetek wśród wszystkich nowotworów złośliwych          | 8.8%      | 8.3%      | 8.6%   |
| Prognozowana liczba przypadków w roku 2024              | 5941      | 4347      | 10288  |
| Prognozowany współczynnik standaryzowany (ASE) dla 2024 | 39.4      | 18.8      | 26.6   |



## Zgony, mężczyźni




## Zgony, kobiety




## Arkusz informacyjny

### Zachorowalność wg płci

Współczynnik standaryzowany (ASE)




Współczynnik surowy




### Umieralność wg płci


Współczynnik standaryzowany (ASE)




Współczynnik surowy



### Zachorowalność według płci (współczynnik standaryzowany ASE)



### Współczynnik standaryzowany (ASE)



### Czynniki zwiększające ryzyko nowotworu okrężnicy i zgięcia esicznego:

- wiek,
- choroby zapalne jelit w przeszłości,
- zespół metaboliczny (nadciśnienie, otyłość, cukrzyca, hipertriglicerydemia, niski HDL) – wzrost ryzyka głównie u mężczyzn,
- dieta ubogobłonnikowa, bogatotłuszczowa, wysokokaloryczna, uboga w wapń,
- palenie tytoniu, spożywanie alkoholu,
- brak aktywności fizycznej.

