



NOWOTWÓR PĘCHERZA MOCZOWEGO - 2019


Arkusz informacyjny

Zachorowalność


	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
Liczba przypadków w roku 2019	5482	1851	7333
Współczynnik surowy	29.5	9.3	19.1
Współczynnik standaryzowany (ASE)	38.0	8.8	20.4
Ryzyko skumulowane (do 74 lat)	1 z 5268	1 z 19456	-
Odsetek wśród wszystkich nowotworów złośliwych	6.4%	2.2%	4.3%
Prognozowana liczba przypadków w roku 2024	6726	2365	9091
Prognozowany współczynnik standaryzowany (ASE) dla 2024	41.4	10.3	22.8



Zachorowania, mężczyźni





Zachorowania, kobiety




Umieralność




	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
Liczba przypadków w roku 2019	3131	1017	4148
Współczynnik surowy	16.9	5.1	10.8
Współczynnik standaryzowany (ASE)	24.2	4.8	12.0
Ryzyko skumulowane (do 74 lat)	1 z 12166	1 z 49852	-
Odsetek wśród wszystkich nowotworów złośliwych	5.8%	2.2%	4.1%
Prognozowana liczba przypadków w roku 2024	3671	1099	4770
Prognozowany współczynnik standaryzowany (ASE) dla 2024	25.6	4.7	12.4



Zgony, mężczyźni




Zgony, kobiety




Arkusz informacyjny

Zachorowalność wg płci

Współczynnik standaryzowany (ASE)




Współczynnik surowy




Umieralność wg płci


Współczynnik standaryzowany (ASE)




Współczynnik surowy



Zachorowalność według płci (współczynnik standaryzowany ASE)



Współczynnik standaryzowany (ASE)



Czynniki zwiększające ryzyko pęcherza moczowego:

- palenie papierosów – 50-65% przypadków wśród mężczyzn i 20-30% przypadków wśród kobiet,
- ekspozycja na niektóre chemikalia stosowane w przemyśle (dotyczy pracowników przemysłu tekstylnego, gumowego, skórzanego, drukarskiego i chemicznego),

więcej na:



<http://onkologia.org.pl>