



NOWOTWÓR PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO - 2019


Arkusze informacyjny

Zachorowalność


	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
Liczba przypadków w roku 2019	177	497	674
Współczynnik surowy	1.0	2.5	1.8
Współczynnik standaryzowany (ASE)	1.2	2.4	1.9
Ryzyko skumulowane (do 74 lat)	1 z 157190	1 z 70616	-
Odsetek wśród wszystkich nowotworów złośliwych	0.2%	0.6%	0.4%
Prognozowana liczba przypadków w roku 2024	133	288	421
Prognozowany współczynnik standaryzowany (ASE) dla 2024	0.8	1.3	1.0



Zachorowania, mężczyźni





Zachorowania, kobiety




Umieralność




	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
Liczba przypadków w roku 2019	193	638	831
Współczynnik surowy	1.0	3.2	2.2
Współczynnik standaryzowany (ASE)	1.4	3.0	2.4
Ryzyko skumulowane (do 74 lat)	1 z 168650	1 z 63971	-
Odsetek wśród wszystkich nowotworów złośliwych	0.4%	1.4%	0.8%
Prognozowana liczba przypadków w roku 2024	196	573	769
Prognozowany współczynnik standaryzowany (ASE) dla 2024	1.2	2.5	2.0







Zgony, mężczyźni




Zgony, kobiety




Arkusz informacyjny



**Zachorowalność według płci
(współczynnik standaryzowany ASE)**



Współczynnik standaryzowany (ASE)



Czynniki zwiększające ryzyko nowotworu pęcherzyka żółciowego:

- kamica (w polskiej populacji jest to głównie kamica cholesterolowa), którą stwierdza się u 75-90% chorych z rakiem pęcherzyka,
- przewlekły odczyn zapalny błony śluzowej pęcherzyka.

