

NOWOTWÓR PRZEŁYKU - 2019






KRAJOWY REJESTR
NOWOTWORÓW

Arkusz informacyjny


Zachorowalność

	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
Liczba przypadków w roku 2019	1139	331	1470
Współczynnik surowy	6.1	1.7	3.8
Współczynnik standaryzowany (ASE)	6.9	1.6	3.9
Ryzyko skumulowane (do 74 lat)	1 z 21764	1 z 100229	-
Odsetek wśród wszystkich nowotworów złośliwych	1.3%	0.4%	0.9%
Prognozowana liczba przypadków w roku 2024	1141	327	1468
Prognozowany współczynnik standaryzowany (ASE) dla 2024	6.4	1.5	3.6

Zachorowania, mężczyźni






Zachorowania, kobiety






Umieralność

	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
Liczba przypadków w roku 2019	1311	334	1645
Współczynnik surowy	7.1	1.7	4.3
Współczynnik standaryzowany (ASE)	8.2	1.6	4.4
Ryzyko skumulowane (do 74 lat)	1 z 19831	1 z 109920	-
Odsetek wśród wszystkich nowotworów złośliwych	2.4%	0.7%	1.6%
Prognozowana liczba przypadków w roku 2024	1258	353	1611
Prognozowany współczynnik standaryzowany (ASE) dla 2024	7.2	1.6	4.0

Zgony, mężczyźni





Zgony, kobiety





Arkusz informacyjny


Zachorowalność wg płci




Umieralność wg płci



Zachorowalność według płci (współczynnik standaryzowany ASE)



Współczynnik standaryzowany (ASE)



Czynniki zwiększające ryzyko nowotworu przełyku:

- wiek,
- nowotwory przełyku częściej występują po 55. roku życia,
- picie wysokoprocentowego alkoholu oraz palenie i żucie tytoniu,
- otyłość i stan po radioterapii śródpiersia,
- czynniki dietetyczne: niedobory witamin, oparzenia gorącymi potrawami, spożywanie ostrych przypraw i nieświeżych pokarmów zanieczyszczonych grzybami pleśniowymi.

