



NOWOTWÓR TARCZYCY - 2019


Arkusz informacyjny

Zachorowalność


	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
Liczba przypadków w roku 2019	758	3490	4248
Współczynnik surowy	4.1	17.6	11.1
Współczynnik standaryzowany (ASE)	4.2	17.2	10.9
Ryzyko skumulowane (do 74 lat)	1 z 33609	1 z 7863	-
Odsetek wśród wszystkich nowotworów złośliwych	0.9%	4.1%	2.5%
Prognozowana liczba przypadków w roku 2024	989	4750	5739
Prognozowany współczynnik standaryzowany (ASE) dla 2024	5.2	23.3	14.4



Zachorowania, mężczyźni





Zachorowania, kobiety




Umieralność




	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
Liczba przypadków w roku 2019	70	181	251
Współczynnik surowy	0.4	0.9	0.7
Współczynnik standaryzowany (ASE)	0.5	0.9	0.7
Ryzyko skumulowane (do 74 lat)	1 z 447924	1 z 266909	-
Odsetek wśród wszystkich nowotworów złośliwych	0.1%	0.4%	0.3%
Prognozowana liczba przypadków w roku 2024	97	203	300
Prognozowany współczynnik standaryzowany (ASE) dla 2024	0.6	0.9	0.8




Zgony, mężczyźni



Zgony, kobiety




Współczynnik standaryzowany (ASE)




Zachorowalność wg płci

Współczynnik surowy




Współczynnik standaryzowany (ASE)




Umieralność wg płci


Współczynnik surowy



Zachorowalność według płci
(współczynnik standaryzowany ASE)



Współczynnik standaryzowany (ASE)



Czynniki zwiększające ryzyko nowotworu tarczycy:

- płeć żeńska kilkakrotnie zwiększa ryzyko zachorowania na raka tarczycy,
- ekspozycja na promieniowanie jonizujące w dzieciństwie.