



NOWOTWÓR WARGI, JAMY USTNEJ I GARDŁA - 2019


Arkusze informacyjny

Zachorowalność


	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
Liczba przypadków w roku 2019	3093	1239	4332
Współczynnik surowy	16.7	6.3	11.3
Współczynnik standaryzowany (ASE)	18.2	5.9	11.4
Ryzyko skumulowane (do 74 lat)	1 z 8161	1 z 25835	-
Odsetek wśród wszystkich nowotworów złośliwych	4%	1%	3%
Prognozowana liczba przypadków w roku 2024	3383	1532	4915
Prognozowany współczynnik standaryzowany (ASE) dla 2024	18.8	7.0	12.3



Zachorowania, mężczyźni





Zachorowania, kobiety




Umieralność




	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
Liczba przypadków w roku 2019	2290	721	3011
Współczynnik surowy	12.3	3.6	7.8
Współczynnik standaryzowany (ASE)	13.8	3.4	8.0
Ryzyko skumulowane (do 74 lat)	1 z 11999	1 z 51727	-
Odsetek wśród wszystkich nowotworów złośliwych	4%	2%	3%
Prognozowana liczba przypadków w roku 2024	15.1	4.0	8.9
Prognozowany współczynnik standaryzowany (ASE) dla 2024	2631	893	3524




Zgony, mężczyźni




Zgony, kobiety




Arkusz informacyjny




Zachorowalność wg płci




Umieralność wg płci



Zachorowalność według płci
(współczynnik standaryzowany ASE)



Współczynnik standaryzowany (ASE)



Czynniki zwiększające ryzyko nowotworu wargi, jamy ustnej i gardła:

- drażnienie błon śluzowych dymem papierosowym i wysokoprocentowym alkoholem,
- zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)
- ekspozycja słoneczna w przypadku nowotworu wargi,
- przewlekłe mechaniczne drażnienie śluzówek poprzez źle dopasowane protezy lub ukruszone zęby.

