



KRAJOWY REJESTR
NOWOTWORÓW



Raport
dotyczący stopni zaawansowania,
leczenia oraz przeżyć chorych na raka
płuca zgłoszonych
do KRN w latach 2014-2016

Wersja 2, aktualizacja 14.04.2020

Warszawa 2019



CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUT
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

Publikacja powstała dzięki grantowi finansowemu AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o. o.

Autorzy:

Dr hab. n. med. Joanna Didkowska

Dr n. med. Urszula Wojciechowska

Dr n. o zdr. Andrzej Śliwczyński

Autorzy pragną podziękować panu dyrektorowi Danielowi Rutkowskiemu za pomoc w przygotowaniu danych Narodowego Funduszu Zdrowia niezbędnych do opracowania tego Raportu.

Raport
dotyczący stopni zaawansowania, leczenia
oraz przeżyć chorych na raka płuca
zgłoszonych do KRN w latach 2014-2016

Warszawa 2019

Publikacja powstała dzięki grantowi finansowemu AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o. o.

Spis treści

Wstęp	1
Materiał i metoda	1
Opis wyników	4
1. Morfologia	4
2. Stadium zaawansowania	8
3. Metoda leczenia	10
4. Rodzaj leczenia	13
5. Przeżycia 1-, 2- i 3-letnie	20
6. Procedury medyczne	29
Wnioski	39
Załącznik 1	40
Załącznik 2	41
Załącznik 3	44
Załącznik 4	47
Załącznik 5	51

Wstęp

Na przełomie lat 60 i 70 ubiegłego wieku w Polsce doszło do transformacji epidemiologicznej - rak płuca stał się najczęstszym nowotworem mężczyzn wyprzedzając raka żołądka.

W 2016 roku po raz pierwszy struktura zachorowań mężczyzn w Polsce upodobniła się do obserwowanej w krajach Europy Zachodniej - na pierwszym miejscu z niewielką przewagą znalazł się rak gruczołu krokowego (19,3%), na drugim rak płuca (17,5%). W końcu lat 60 ubiegłego wieku rak płuca stał się najczęstszą nowotworową przyczyną zgonu mężczyzn, a od prawie dekady również kobiet (wyprzedzając raka piersi).

Mimo korzystnych zmian zachodzących w populacji mężczyzn (spadek zachorowalności i umieralności) rak płuca nadal pozostaje najczęstszym nowotworem w Polsce (14% zachorowań i 24% zgonów nowotworowych). W 2016 roku rozpoznano ponad 22 tysiące nowych zachorowań na ten nowotwór.

Dotychczas nie przeprowadzono w Polsce kompleksowej oceny zaawansowania chorych na raka płuca w momencie rozpoznania zgłoszonych do Krajowego Rejestru Nowotworów, jak również nie został oceniony sposób leczenia tych pacjentów.

Materiał i metoda

Analiza obejmuje 3-letni okres obserwacji pacjentów z chorobą zdiagnozowaną i leczoną w latach 2014-2016. W bazie KRN zarejestrowano w tym okresie ponad 67 tys. pacjentów z diagnozą „rak płuca” (ICD10 - C34) zgłoszonych jako pierwszorazowe zachorowania. Poniższa analiza została przeprowadzona oddzielnie dla kobiet i mężczyzn oraz w podziale na województwa. Kryterium przypisania pacjenta do województwa stanowiło miejsce stałego zamieszkania.

Zgodnie z obowiązującym prawem (Dz.U. 2018 poz. 1197, Dz.U. 2011 nr 113 poz. 657, Dz.U. 1995 nr 88 poz. 439) każdy przypadek zachorowania na nowotwór złośliwy powinien być zgłoszony do Krajowego Rejestru Nowotworów. Przypadki zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce są rejestrowane na podstawie zgłoszeń kart zgłoszenia

nowotworów złośliwych (druk MZ/N-1a). Obowiązek zgłaszania kart KZNZ jest nałożony na lekarzy. Karty KZNZ mogą też zgłaszać jednostki organizacyjne ochrony zdrowia, jednak w każdym przypadku osobą wystawiającą (podpisującą) kartę musi być lekarz. Karta KZNZ zawiera szczegółowe informacje dotyczące daty zachorowania, diagnozy i zaawansowania choroby oraz leczenia pacjenta. Zgłoszenia przypadków zachorowań przechodzą weryfikację merytoryczną w wojewódzkich biurach rejestracji nowotworów właściwych dla miejsca zamieszkania pacjenta. Sprawdzeniu podlega również status pacjenta, tzn. czy był wcześniej zgłoszony do KRN i czy poprzednie zgłoszenie dotyczyło tego samego nowotworu. Proces weryfikacji danych trwa około dwóch lat, co sprawia, że zbiór roczny za dany rok statystyczny zamykany jest z dniem 30

listopada 2 lata później (przykładowo zbiór za 2017 rok został zamknięty w listopadzie 2019 roku).

Karta Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego (KZNZ) zawiera 43 pola (Załącznik 1). Do niniejszej analizy wykorzystano informacje dotyczące daty rozpoznania nowotworu (pole 17), daty zgonu (21), rozpoznania klinicznego (25), rozpoznania histopatologicznego (26), zaawansowania według klasyfikacji TNM (32), stopnia zaawansowania (34), stadium zaawansowania (35), informacji o sposobie leczenia (37 i 38) oraz rodzaju leczenia (40).

Analiza stadium zaawansowania została przeprowadzona po przypisaniu każdemu pacjentowi stopnia zaawansowania na podstawie wszystkich informacji dotyczących zaawansowania choroby występujących w KZNZ. Wykorzystano do tego trzy kategorie: zaawansowanie miejscowe (guz ograniczony do narządu), zaawansowanie regionalne (zajęte regionalne węzły chłonne), zaawansowanie uogólnione (przerzuty odległe), które zostały określone na podstawie pól 32-34 (Załącznik 1). Kategorie te przypisano każdemu pacjentowi wykorzystując najbardziej dokładną informację zawartą we wszystkich wymienionych polach. Kody TNM zostały pogrupowane w powyższe kategorie na podstawie algorytmu opisanego w klasyfikacji TNM według następującego klucza:

stadium miejscowe – stopnie zaawansowania I+II, stadium regionalne – stopień III, stadium uogólnione – stopień IV.

Analiza typów morfologicznych została przeprowadzona na podstawie Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób dla Onkologii (ICD-O-3)

http://onkologia.org.pl/wp-content/uploads/ICD_O_3_PL.pdf.

Poszczególne typy morfologiczne zostały pogrupowane w sześciu grupach, zgodnie z ICD-O-3 (patrz tab. 1.1). Ze względu na odmienne postępowanie terapeutyczne do dalszej analizy wydzielono dwie grupy – raki niedrobnokomórkowe (rak płaskonabłonkowy, gruczolakorak, rak wielkomórkowy, inne określone raki i raki niedokładnie określone) i raki drobnokomórkowe.

Wyniki przedstawiono w postaci dwóch rodzajów tabel – prezentując wszystkie kategorie z wydzieloną kategorią „brak danych” (zwykle dla Polski ogółem) oraz w prezentując udziały bez uwzględnienia braku danych (w tabelach znajduje się stosowna informacja). Prezentując udziały w poszczególnych kategoriach przyjęto założenie, że w grupie z brakiem danych każda z analizowanych cech rozkłada się podobnie, jak w grupie z określonymi cechami.

Tabela 1.1

Typy morfologiczne nowotworów płuca włączone do analizy (zgodnie z klasyfikacją ICD-O-3)

LP	Nazwa (ICD-O-3)	Kod (ICD-O-3)
1	Rak płaskonabłonkowy <i>squamous cell carcinoma</i>	8050–8076, 8083-8084
2	Rak niedrobnokomórkowy <i>Non-small cell carcinoma</i>	8046
3	Gruczolakorak <i>adenocarcinoma</i>	8140-8141, 8211, 8230–8231, 8250–8260, 8310, 8323, 8430, 8480–8490, 8550–8560, 8570–8572
4	Rak drobnokomórkowy <i>small cell carcinoma</i>	8040–8045

LP	Nazwa (ICD-O-3)	Kod (ICD-O-3)
5	Rak wielkokomórkowy large/undifferentiated cell carcinoma	8012–8031
6	Inne określone nowotwory <i>other specified carcinoma</i>	z zakresu 8012-9581 z wykluczeniem kodów z pozycji 1-4
7	Raki niedokładnie określone <i>unspecified carcinoma</i>	8000–8004, 8010–8011

*lista kodów w Załączniku 2

Analizę przeżyć wykonano metodą Hakulinena wykorzystując tablice trwania życia według płci dla Polski i poszczególnych województw. Pacjentów włączonych do analizy obserwowano do 31-12-2018 roku. Tablice trwania życia wykorzystane do analiz przeżyć pochodzą z Głównego Urzędu Statystycznego. Analiza przeżyć w podziale na województwa i kategorie włączone do analizy oraz płeć sprawia, że w niektórych podgrupach znajdowało się mniej niż 5 osób, co jest

pewnym ograniczeniem tej analizy ze względu na bardzo szerokie przedziały ufności – w takich przypadkach wyniki nie zostały zaprezentowane.

Analiza dotycząca leczenia chirurgicznego, chemioterapii i radioterapii została wykonana na podstawie danych uzyskanych w Narodowym Funduszu Zdrowia. Kryteria włączenia do analizy zostały opisane w rozdziale 6.

Opis wyników

1. Morfologia

Tabela 1.2

Liczba przypadków raka płuca zdiagnozowanych w latach 2014-2016 zgłoszonych do KRN, według płci i wieku

Płeć	Liczba (%)	Wiek <35 lat		Wiek 35-64 lat		Wiek 65+ lat	
Kobiety	22 892 (34%)	61	0,3%	9 794	43%	13 037	57%
Mężczyźni	44 191 (66%)	66	0,1%	17 673	40%	26 452	60%
Ogółem	67 083	127	0,2%	27 467	41%	39 489	59%

Analizowany materiał obejmuje 67 083 pacjentów, z czego ponad 44 000 stanowili mężczyźni (66%). Rozkład częstości zachorowań według wieku nie wykazuje zależności od płci. Odsetek osób przed 35 rokiem życia nie przekraczał 0,2%. Około 40% zachorowań wystąpiło u osób w średnim wieku (35-64 lat), a większość zachorowań przypada po 65 roku życia (tab. 1.2).

W 13% przypadków (8 890 zachorowań) w Karcie Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego nie zgłoszono postaci morfologicznej nowotworu. Odsetek braku danych nie był jednolity w województwach – największy odsetek braku danych notowano w województwach śląskim (27%), wielkopolskim (24%), małopolskim i dolnośląskim (23%) oraz mazowieckim i podlaskim (21%) (tab. 1.3).

Tabela 1.3

Liczba przypadków zdiagnozowanych w latach 2014-2016 zgłoszonych do KRN bez podania morfologii nowotworu lub morfologia niedokładnie określona

Typ morfologiczny	Ogółem		Mężczyźni		Kobiety	
Morfologia nieznana	8 890	13%	5 929	13%	2 961	13%
Morfologia niedokładnie określona	3 996	6%	2 584	6%	1 412	6%
Ogółem	12 886	19%	8 513	19%	4 373	19%

W grupie pacjentów, dla których określono postać morfologiczną nowotworu, dominował rak niedrobnokomórkowy (83%) (84% wśród mężczyzn, 79% wśród kobiet). Rak drobnokomórkowy stanowił 16% nowotworów zgłoszonych do Krajowego Rejestru

Nowotworów (15% u mężczyzn, 19% u kobiet). Grupa „raki niedrobnokomórkowe” zawiera następujące rozpoznania histopatologiczne: rak płaskonabłonkowy (około 30% nowotworów płuca u obu płci), gruczolakorak (około 25%), rak wielkokomórkowy (około 4%) oraz liczna

grupa „inne określone raki” (około 18% - *patrz tab. 1.1*). Przewaga gruczolakoraków u kobiet (29%) w Polsce jest zgodna z obserwacjami w innych krajach^{1,2}. Grupa „raki niedokładnie określone” (7%) obejmuje tych pacjentów, u

których informacja dotycząca rozpoznania histopatologicznego nie była na tyle precyzyjnie określona, żeby było możliwe przypisanie ich do którejkolwiek określonej kategorii (tab. 1.4).

Tabela 1.4

Rak płuca według określonych typów morfologicznych u chorych zdiagnozowanych w latach 2014-2016 zgłoszonych do KRN*

Typ morfologiczny	Ogółem		Mężczyźni		Kobiety	
Rak drobnokomórkowy	9 410	17%	5 572	16%	3 838	21%
Rak niedrobnokomórkowy	44 787	83%	30 106	84%	14 681	79%
w tym						
Rak płaskonabłonkowy	17 547	39%	13 170	44%	4 377	30%
Rak niedrobnokomórkowy (8046)	9 060	20%	6 013	20%	3 047	21%
Gruczolakoraki	14 438	32%	8 665	29%	5 773	39%
Rak wielkokomórkowy	2 435	5%	1 580	5%	855	6%
Inne określone nowotwory	1 307	3%	678	2%	629	4%
Ogółem	54 197		35 678		18 519	

*bez braku danych lub morfologia niedokładnie określona

Odsetek raków drobnokomórkowych wahał się od 10% w dolnośląskim do 22%-23% w województwach lubelskim, warmińsko-mazurskim i kujawsko-pomorskim. Raki niedrobnokomórkowe stanowiły od 77% w województwie kujawsko-pomorskim do 90% raków płuca w województwie dolnośląskim. Rys. 1.1 ilustruje również znaczne różnice wojewódzkie w kompletności przekazywania do KRN informacji o typie morfologicznym guza – w województwie pomorskim zaledwie 6% pacjentów nie miało określonej morfologii guza, podczas gdy np. w województwie śląskim

niemal dla jednej trzeciej pacjentów brakuje tej informacji lub jest niepełna. Wyłączenie z analizy pacjentów z brakiem informacji o typie morfologicznym pokazuje częstość występowania raka drobnokomórkowego w (17%) i niedrobnokomórkowego (83%) w Polsce (*patrz rys. 1.2 i 1.3*). Ze względu na najniższy odsetek „raków nieokreślonych” w województwie pomorskim (6%) wydaje się, że rozróżnienie na raki *drobno-* (20%) i *niedrobnokomórkowe* (80%) dla tego województwa jest bardzo wiarygodne (tab. 1.5).

¹ Meza R et al. Lung Cancer Incidence Trends by Gender, Race and Histology in the United States, 1973–2010.
doi.org/10.1371/journal.pone.0121323

² Barrera-Rodriguez R, Morales-Fuentes J. Lung cancer in women. doi: 10.2147/LCTT.S37319


Tabela 1.5

Rozkład typów morfologicznych raka płuca u chorych zdiagnozowanych w latach 2014-2016 zgłoszonych do KRN, według województw

Województwo	Ogółem	Brak danych lub morfologia niedokładnie określona		Rak drobnokomórkowy		Rak niedrobnokomórkowy	
	LB	LB	%	LB	%	LB	%
Dolnośląskie	5 560	1 297	23%	430	8%	3 833	69%
Kujawsko-pomorskie	4 858	602	12%	976	20%	3 280	68%
Lubelskie	3 320	534	16%	615	19%	2 171	65%
Lubuskie	1 755	398	23%	244	14%	1 113	63%
Łódzkie	4 430	856	19%	510	12%	3 064	69%
Małopolskie	4 865	1 105	23%	712	15%	3 048	63%
Mazowieckie	8 035	1 715	21%	843	10%	5 477	68%
Opolskie	1 553	165	11%	272	18%	1 116	72%
Podkarpackie	2 841	471	17%	379	13%	1 991	70%
Podlaskie	1 555	324	21%	244	16%	987	63%
Pomorskie	4 812	302	6%	888	18%	3 622	75%
Śląskie	8 371	2 233	27%	1 127	13%	5 011	60%
Świętokrzyskie	2 389	269	11%	318	13%	1 802	75%
Warmińsko-mazurskie	3 102	596	19%	557	18%	1 949	63%
Wielkopolskie	6 153	1 502	24%	798	13%	3 853	63%
Zachodniopomorskie	3 484	517	15%	497	14%	2 470	71%
Polska	67 083	12 886	19%	9 410	14%	44 787	67%


Rysunek 1.1

Brak informacji o typie morfologicznym (lub typ niedokładnie określony) raka płuca u chorych zdiagnozowanych w latach 2014-2016 zgłoszonych do KRN




Rysunek 1.2

Niedrobnokomórkowe raki płuca u chorych zdiagnozowanych w latach 2014-2016 zgłoszonych do KRN (z wyłączeniem braków danych i nowotworów niedokładnie określonych)



Rysunek 1.3

Drobnokomórkowe raki płuca u chorych zdiagnozowanych w latach 2014-2016 zgłoszonych do KRN (z wyłączeniem braków danych i nowotworów niedokładnie określonych)



2. Stadium zaawansowania

Wśród pacjentów z rakiem płuca zgłoszonych do Krajowego Rejestru Nowotworów w latach 2014-2016 stadium zaawansowania zostało określone w karcie zgłoszenia nowotworu złośliwego w 80%. Brak informacji o stadium zaawansowania był bardzo zróżnicowany w zależności od województwa. W województwie opolskim dla zaledwie 2 pacjentów (0,012%), a województwie podlaskim dla 3 pacjentów (0,02%) nie podano informacji o stadium zaawansowania w karcie zgłoszenia nowotworu, podczas gdy w Zachodniopomorskim i Łódzkim odsetek braków danych w zakresie stadium zaawansowania dotyczył ponad jednej trzeciej pacjentów, a województwie lubelskim nawet 43% (tab. 2.1).

Tabele 2.1-2.3 ilustrują rozkład stadium zaawansowania raka płuca w momencie rozpoznania u tych pacjentów, dla których taka informacja trafiła do KRN (tzn. z pominięciem braków danych). W Polsce 50% pacjentów z rakiem płuca rozpoczyna leczenie z zaawansowanym nowotworem (stadium uogólnione), 30% w stadium regionalnym, a

19% w stadium miejscowym. Interpretacja danych wojewódzkich jest bardzo utrudniona ze względu na brak możliwości oceny stadium zaawansowania przy tak wysokim odsetku braku danych. Wydaje się, że za wiarygodne można uznać wyniki uzyskane w tych województwach, w których odsetek braku danych mieści się w zakresie 5-20%. Taka sytuacja ma miejsce w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, małopolskim, mazowieckim, podkarpackim, warmińsko-mazurskim, pomorskim i wielkopolskim. W województwach tych odsetek pacjentów w miejscowym stadium zaawansowania wahał się od 10% (mazowieckie) do 28% (warmińsko-mazurskie) (rys. 2.1). Grupa pacjentów rozpoznanych w regionalnym stadium zaawansowania stanowiła około jedną trzecią pacjentów w określonym stadium zaawansowania (rys. 2.2). Odsetek pacjentów zgłoszonych do Krajowego Rejestru Nowotworów w uogólnionym stadium zaawansowania wahał się od 40 do 60% (rys. 2.3).

Tabela 2.1


Stadium zaawansowania raka płuca w chwili diagnozy u chorych zdiagnozowanych w latach 2014-2016 zgłoszonych do KRN według województw

Województwo	Ogółem	Miejscowe		Regionalne		Uogólnione		Brak danych	
		LB	%	LB	%	LB	%	LB	%
Dolnośląskie	5 560	880	16%	1 338	24%	2 287	41%	1 055	19%
Kujawsko-pomorskie	4 858	699	14%	1 286	26%	2 035	42%	838	17%
Lubelskie	3 320	218	7%	672	20%	1 013	31%	1 417	43%
Lubuskie	1 755	406	23%	505	29%	729	42%	115	7%
Łódzkie	4 430	1 153	26%	646	15%	1 249	28%	1 382	31%
Małopolskie	4 865	808	17%	1 148	24%	2 037	42%	872	18%
Mazowieckie	8 035	674	8%	2 163	27%	3 612	45%	1 586	20%
Opolskie	1 553	324	21%	648	42%	579	37%	2	0%
Podkarpackie	2 841	564	20%	757	27%	1 195	42%	325	11%

Województwo	Ogółem	Miejscowe		Regionalne		Uogólnione		Brak danych	
		LB	%	LB	%	LB	%	LB	%
Podlaskie	1 555	332	21%	515	33%	705	45%	3	0%
Pomorskie	4 812	960	20%	1 147	24%	2 196	46%	509	11%
Śląskie	8 371	1 259	15%	2 140	26%	3 098	37%	1 874	22%
Świętokrzyskie	2 389	389	16%	498	21%	935	39%	567	24%
Warmińsko-mazurskie	3 102	712	23%	732	24%	1 138	37%	520	17%
Wielkopolskie	6 153	643	10%	1 461	24%	3 076	50%	973	16%
Zachodniopomorskie	3 484	438	13%	662	19%	1 142	33%	1 242	36%
Polska	67 083	10 459	16%	16 318	24%	27 026	40%	13 280	20%


Rysunek 2.1

Miejscowe stadium zaawansowanie raka płuca u chorych zdiagnozowanych w latach 2014-2016 zgłoszonych do KRN (z wyłączeniem braków danych)




Rysunek 2.2

Regionalne stadium zaawansowanie raka płuca u chorych zdiagnozowanych w latach 2014-2016 zgłoszonych do KRN (z wyłączeniem braków danych)



Rysunek 2.3

Uogólnione stadium zaawansowanie raka płuca u chorych zdiagnozowanych w latach 2014-2016 zgłoszonych do KRN (z wyłączeniem braków danych)



*Tabele z danymi znajdują się w Załączniku 3

3. Metoda leczenia

Karta Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego zawiera informacje o typach podjętego leczenia w zależności od stosowanych metod. Podział na typy leczenia jest uzależniony od przyjętego schematu postępowania – jeżeli pacjent miał od początku zaplanowany określony sposób leczenia obejmujący różne rodzaje leczenia (chemioterapia, chirurgia, radioterapia w dowolnej kombinacji) mające na celu wyleczenie (ITT), to wówczas trafiał do kategorii „leczenie skojarzone”. Jeżeli wobec pacjenta stosowano jednak różne rodzaje leczenia, ale nie zaplanowano tego wcześniej, to uznano, że pacjent nie był leczony w sposób skojarzony (leczenie nieskojarzone).

Wśród pacjentów z rakiem płuca zdiagnozowanych w latach 2014-2016 wobec zaledwie 5% zastosowano leczenie skojarzone, wobec 70% pacjentów leczenie nieskojarzone, a u 25% pacjentów nie określono typu leczenia (tab. 3.1). W grupie pacjentów, u których

określono typ i stadium zaawansowania (por. tab. 3.2, rys. 3.4) nie są widoczne znaczące zależności. Odsetek pacjentów leczonych w sposób skojarzony lub nieskojarzony jest niezależny od stadium zaawansowania.

Odsetek pacjentów leczonych w sposób skojarzony i nieskojarzony według stadium zaawansowania w poszczególnych województwach nie odbiegał od obserwowanego dla całej Polski. Leczenie skojarzone nie było istotnie częściej ordynowane pacjentom w miejscowym stadium zaawansowania niż w innych stadiach. Jedynie w województwie zachodniopomorskim aż 27% pacjentów z miejscowym zaawansowaniem miało wdrożone leczenie skojarzone (rys. 3.5).

Wydaje się, że pola 37 i 38 w wielu przypadkach są źle interpretowane przez osoby wypełniające Kartę Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego.

Tabela 3.1

Typ leczenia chorych na raka płuca zgłoszonych do KRN w latach 2014-2016

Typ leczenia	Kobiety		Mężczyźni		Ogółem	
Skojarzone	1 176	5%	2 289	5%	3 465	5%
Nieskojarzone	16 215	71%	30 567	69%	46 782	70%
Brak danych	5 501	24%	1 1335	26%	16 836	25%
Ogółem	22 892		44 191		67 083	

Tabela 3.2

Typ leczenia chorych na raka płuca zgłoszonych do KRN w latach 2014-2016 w zależności od stadium zaawansowania

Typ leczenia	Liczba	Miejscowe		Regionalne		Uogólnione		Brak danych	
Skojarzone	3 465	573	5%	1 281	8%	1 153	4%	458	3%
Nieskojarzone	46 782	7 515	72%	11 745	72%	19 664	73%	7 858	59%
Brak danych	16 836	2 371	23%	3 292	20%	6 209	23%	4 964	37%
Ogółem	67 083	10 459		16 318		27 026		13 280	


Tabela 3.3

Typ leczenia chorych na raka płuca zgłoszonych do KRN w latach 2014-2016 wg województw

Województwo	Liczba	Skojarzone		Nieskojarzone		Brak danych	
Dolnośląskie	5 560	420	8%	4 546	82%	594	11%
Kujawsko-pomorskie	4 858	424	9%	4 409	91%	25	1%
Lubelskie	3 320	266	8%	1 767	53%	1 287	39%
Lubuskie	1 755	60	3%	1 193	68%	502	29%
Łódzkie	4 430	169	4%	3 549	80%	712	16%
Małopolskie	4 865	227	5%	2 387	49%	2 251	46%
Mazowieckie	8 035	197	2%	7 789	97%	49	1%
Opolskie	1 553	42	3%	1 263	81%	248	16%
Podkarpackie	2 841	175	6%	1 805	64%	861	30%
Podlaskie	1 555	58	4%	1 286	83%	211	14%
Pomorskie	4 812	179	4%	3 381	70%	1 252	26%
Śląskie	8 371	265	3%	4 490	54%	3 616	43%
Świętokrzyskie	2 389	107	4%	1 560	65%	722	30%
Warmińsko-mazurskie	3 102	195	6%	1 825	59%	1 082	35%
Wielkopolskie	6 153	301	5%	3 633	59%	2 219	36%
Zachodniopomorskie	3 484	380	11%	1 899	55%	1 205	35%
Polska	67 083	3 465	5%	46 782	70%	16 836	25%


Rysunek 3.4


Typ leczenia chorych na raka płuca zgłoszonych do KRN w latach 2014-2016 wg województw (bez braków danych)



Rysunek 3.5

Typ leczenia chorych na raka płuca zgłoszonych do KRN w latach 2014-2016 w zależności od stadium zaawansowania wg województw





4. Rodzaj leczenia

Rodzaj leczenia jest zdefiniowany w Karcie Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego ze względu na kryterium celu leczenia. Kategoria „leczenie radykalne” obejmuje chorych, u których zastosowane leczenie miało doprowadzić do trwałego lub długoletniego wyleczenia. Kategoria „leczenie paliatywne” obejmuje chorych, których leczenie ma na celu przedłużenie życia w jak najlepszej kondycji, jednak nie gwarantuje wyleczenia z choroby. Kategoria „leczenie objawowe” obejmuje chorych, którym można zaoferować leczenie zmniejszające najbardziej dokuczliwe efekty choroby (np. leczenie przeciwbólowe).

Wśród pacjentów z rakiem płuca zdiagnozowanych w latach 2014-2016 i zgłoszonych do Krajowego Rejestru Nowotworów u około 10% nie było informacji o rodzaju leczenia, a w przypadku niemal 30% uzyskano jedynie informację, że pacjenci zostali skierowani na leczenie. Mniej niż 1% chorych nie wyraził zgody na leczenie (podobny odsetek u obu płci). W około 15% przypadków zastosowano leczenie radykalne, u prawie jednej trzeciej chorych wdrożono leczenie paliatywne i u 16% leczenie objawowe (tab. 4.1).

Tabela 4.1

Rodzaj leczenia chorych na raka płuca u chorych zdiagnozowanych w latach 2014-2016 zgłoszonych do KRN

Leczenie	Ogółem		Kobiety		Mężczyźni	
	LB	%	LB	%	LB	%
Brak danych	6 801	10%	2 250	10%	4 551	10%
Brak zgody na leczenie	352	0,5%	121	0,5%	231	0,5%
Objawowe	10 986	16%	3 497	15%	7 489	17%
Paliatywne	19 305	29%	6 565	29%	12 740	29%
Radykalne	10 170	15%	3 706	16%	6 464	15%
Skierowanie na leczenie	19 469	29%	6 753	29%	12 716	29%
Ogółem	67 083		22 892		44 191	

Informacja o rozkładzie rodzaju leczenia według województw jest obarczona dużym błędem wynikającym z bardzo wysokiego odsetka chorych, których bądź „skierowano na leczenie”, bądź nie podano żadnej informacji o rodzaju leczenia. W tabeli 4.2 przedstawiono odsetek pacjentów według województw i

rodzaju leczenia. Jedynie w pięciu województwach (dolnośląskie, opolskie, podkarpackie, podlaskie i wielkopolskie) odsetek pacjentów z „brakiem danych” lub informacja „skierowany na leczenie” nie przekracza 30% (tab. 4.2).

Tabela 4.2

Rodzaj leczenia chorych na raka płuca u chorych zdiagnozowanych w latach 2014-2016 zgłoszonych do KRN, według województw


Województwo	Ogółem	Brak danych		Brak zgody na leczenie		Objawowe		Paliatywne		Radykalne (przeciwnowotworowe)		Skierowanie na leczenie	
		LB	%	LB	%	LB	%	LB	%	LB	%	LB	%
Dolnośląskie	5560	210	4%	30	1%	1058	19%	2176	39%	1132	20%	954	17%
Kujawsko-pomorskie	4858	19	0,4%	15	0,3%	531	11%	1807	37%	494	10%	1992	41%
Lubelskie	3320	1139	34%	19	0,6%	454	14%	698	21%	599	18%	411	12%
Lubuskie	1755	50	3%	13	0,7%	192	11%	544	31%	273	16%	683	39%
Łódzkie	4430	595	13%	12	0,3%	731	17%	752	17%	1028	23%	1312	30%
Małopolskie	4865	1093	22%	34	0,7%	889	18%	1042	21%	363	7%	1444	30%
Mazowieckie	8035	32	0,4%	30	0,4%	1680	21%	2236	28%	1358	17%	2699	34%
Opolskie	1553	3	0,2%	4	0,3%	262	17%	562	36%	464	30%	258	17%
Podkarpackie	2841	42	1%	14	0,5%	732	26%	742	26%	449	16%	862	30%
Podlaskie	1555	3	0,2%	12	0,8%	330	21%	829	53%	138	9%	243	16%
Pomorskie	4812	190	4%	24	0,5%	857	18%	830	17%	585	12%	2326	48%
Śląskie	8371	1422	17%	49	0,6%	966	12%	2757	33%	969	12%	2208	26%
Świętokrzyskie	2389	823	34%	23	1,0%	345	14%	630	26%	165	7%	403	17%
Warmińsko-mazurskie	3102	371	12%	23	0,7%	326	11%	498	16%	519	17%	1365	44%
Wielkopolskie	6153	481	8%	36	0,6%	1335	22%	2238	36%	1016	17%	1047	17%
Zachodnio-pomorskie	3484	328	9%	14	0,4%	298	9%	964	28%	618	18%	1262	36%
Polska	67083	6801	10%	352	0,5%	10986	16%	19305	29%	10170	15%	19469	29%

Leczeniem radykalnym objęto w Polsce 17% chorych na raka płuca (nie uwzględniono braków danych). Odsetek chorych wahał się od 9% w województwie podlaskim do 30% w województwie opolskim (rys. 4.1). Tak wysoki udział leczenia radykalnego obserwowano

również w województwach lubelskim i łódzkim (27%). Najniższy odsetek chorych, u których wdrożono leczenie radykalne, obserwowano w województwach świętokrzyskim (11%), kujawsko-pomorskim (10%), małopolskim (10%) i podlaskim (9%).

Rysunek 4.1

Chorzy na raka płuca leczeni radykalnie, zdiagnozowani w latach 2014-2016 zgłoszeni do KRN, według województw (z wyłączeniem braków danych)




Leczenie paliatywne oferowano jednej trzeciej pacjentów, u których określono rodzaj leczenia, przy czym odsetek ten wahał się od 18% w województwach pomorskim i warmińsko-mazurskim do 53% w województwie podlaskim (rys. 4.2). W województwach o małym odsetku

„braków danych” i „skierowanych na leczenie”, a więc najbardziej miarodajnych, leczenie paliatywne otrzymywało około 40% pacjentów z rakiem płuca (wyjątkiem jest województwo podkarpackie, gdzie około jedna trzecia pacjentów otrzymuje leczenie paliatywne).

Rysunek 4.2

Chorzy na raka płuca leczeni paliatywnie, zdiagnozowani w latach 2014-2016 zgłoszeni do KRN, według województw (z wyłączeniem braków danych)




Leczeniem objawowym leczono około 18% pacjentów z rakiem płuca, u których określono rodzaj leczenia. Odsetek leczonych objawowo wahał się od 9% (województwo zachodniopomorskie) do 26% (województwo

podkarpackie. W województwach o wysokim odsetku określonego rodzaju leczenia odsetek leczonych objawowo wynosił od 17% (województwo opolskie) do 26% (podkarpackie) (rys. 4.3).

Rysunek 4.3

Chorzy na raka płuca leczeni objawowo, zdiagnozowani w latach 2014-2016 zgłoszeni do KRN, według województw (z wyłączeniem braków danych).



Stopień zaawansowania nowotworu w momencie diagnozy powinien być skorelowany z proponowanym leczeniem. Pacjenci z zaawansowaniem miejscowym najczęściej byli leczeni radykalnie (40%), z kolei pacjenci w uogólnionym stadium choroby najczęściej mieli wdrażane leczenie objawowe (24%) lub paliatywne (42%) (tab. 4.3). Nie uwzględniając rekordów z brakami danych pacjenci z

miejscowym stadium otrzymywali głównie leczenie radykalne (44%); pacjenci w stadium regionalnym leczenie paliatywne (29%), a w uogólnionym leczenie paliatywne (42%) lub objawowe (24%). Zwraca uwagę wysoki odsetek pacjentów w grupie „skierowany na leczenie” – 36% pacjentów w zbiorze KRN miało jedynie taki wpis jako informację o rodzaju leczenia.

Tabela 4.3a

Rodzaj leczenia w zależności od stadium zaawansowania u chorych na raka płuca zdiagnozowanych w latach 2014-2016.

Rodzaj leczenia	Ogółem	Miejscowe	Regionalne	Uogólnione	Brak danych
Brak danych	6 801	925 9%	1 432 9%	2 053 8%	2 391 18%
Brak zgody na leczenie	352	36 0%	66 0%	151 1%	99 1%
Objawowe	10 986	711 7%	1 573 10%	6 496 24%	2 206 17%
Paliatywne	19 305	915 9%	4 673 29%	11 250 42%	2 467 19%
Radykalne	10 170	4 227 40%	3 511 22%	1 065 4%	1 367 10%
Skierowanie na leczenie	19 469	3 645 35%	5 063 31%	6 011 22%	4 750 36%
Ogółem	67 083	10 459	16 318	27 026	13 280

Tabela 4.3b

Rodzaj leczenia w zależności od stadium zaawansowania u chorych na raka płuca zdiagnozowanych w latach 2014-2016 (bez uwzględnienia braków danych o rodzaju leczenia)


Rodzaj leczenia	Ogółem	Miejscowe	Regionalne	Uogólnione
Brak zgody na leczenie	352	0%	0%	1%
Objawowe	10 986	7%	11%	26%
Paliatywne	19 305	10%	31%	45%
Radykalne	10 170	44%	24%	4%
Skierowanie na leczenie	19 469	38%	34%	24%

W większości województw (8) chorzy w stadium zaawansowania miejscowym otrzymywali leczenie radykalne (od 40% w województwie podkarpackim do 70% w województwie mazowieckim) (rys. 4.3). W kilku

województwach trudno ocenić sposób leczenia, gdyż znaczna frakcja pacjentów miała status „skierowany na leczenie” – w województwie kujawsko-pomorskim, lubuskim, warmińsko-mazurskim czy pomorskim ponad 50%.

Rysunek 4.3

Rodzaj leczenia u chorych na raka płuca zdiagnozowanych w latach 2014-2016 według województw. Stadium miejscowe*.




*Tabele z danymi znajdują się w Załączniku 4,

Rodzaj leczenia pacjentów zdiagnozowanych w regionalnym stadium choroby był bardzo zróżnicowany w zależności od województwa. W wielu województwach około 50% pacjentów w Karcie Zgłoszenia Nowotworu złośliwego miało wpisane jedynie informację „skierowany na leczenie” i w żadnej z kart zgłoszenia nowotworu nie doprecyzowano, jakiego było typu: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie. W pozostałych województwach chorzy najczęściej byli leczeni paliatywnie lub objawowo. W województwie lubelskim 40% pacjentów otrzymywało leczenie radykalne przy zaawansowaniu regionalnym. Większość pacjentów otrzymywała

jednak leczenie paliatywne (szczególnie duży odsetek w województwie podlaskim - 65%) i objawowe (od 5% w Kujawsko-pomorskim do 21% w Podkarpackiem).

Rysunek 4.4

Rodzaj leczenia u chorych na raka płuca zdiagnozowanych w latach 2014-2016 według województw. Stadium regionalne*



*Tabele z danymi znajdują się w Załączniku 4

Pacjenci rozpoznani w stadium uogólnionym najczęściej mieli ordynowane leczenie paliatywne lub objawowe (por. ryc. 4.5). Odsetek pacjentów objętych leczeniem paliatywnym wahał się od 28% w województwie warmińsko-mazurskim do ponad 50% w województwach dolnośląskim,


lubelskim, opolskim, podlaskim, śląskim, świętokrzyskim i wielkopolskim. Drugim najczęściej wdrażanym rodzajem leczenia było leczenie objawowe – 13-35% pacjentów rozpoznanych w stadium uogólnionym jako pierwsze leczenie miało zaproponowane leczenie objawowe. W województwach

kujawsko-pomorskim, małopolskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim zdumiewająco duży odsetek pacjentów ma status „skierowany na leczenie”. Oznacza to, że jednostka lecznicza, która rozpoznała chorobę

nie podjęła leczenia oraz, że dla pacjentów ze skierowaniem z innej jednostki nie są rzetelnie wypełniane karty zgłoszenia nowotworu złośliwego.

Rysunek 4.5

Rodzaj leczenia u chorych na raka płuca zdiagnozowanych w latach 2014-2016 według województw. Stadium uogólnione*



*Tabele z danymi znajdują się w Załączniku 4

5. Przeżycia 1-, 2- i 3-letnie

Rokowanie pacjentów z rakiem płuca jest gorsze niż w przypadku chorych na inne najczęstsze nowotwory. Wśród pacjentów zdiagnozowanych w latach 2014-2016 i obserwowanych do 31 grudnia 2018 roku 3-

letnie wskaźniki przeżyć względnych wynosiły 17% (CI: 16,3-17,1%) dla mężczyzn i 24% (CI: 23,1-24,3) dla kobiet (tab. 5.1, rys. 5.1). Wszystkie wskaźniki przeżyć kolejnych lat były wyższe dla kobiet.


Tabela 5.1

Wskaźniki przeżyć chorych na raka płuca w Polsce (diagnoza w latach 2014-2016, koniec obserwacji do 31-12-2018 roku) według płci

Przeżycia	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	44 168	37,1%	37,8%	37,4%	38,3%
2-letnie	16 392	21,2%	22,1%	21,7%	22,5%
3-letnie	9 378	15,7%	16,7%	16,3%	17,1%
Przeżycia	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	22 869	44,6%	45,2%	44,5%	45,8%
2-letnie	10 193	29,0%	29,8%	29,2%	30,4%
3-letnie	6 634	22,8%	23,7%	23,1%	24,3%

Rysunek 5.1

Wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w Polsce (diagnoza w latach 2014-2016, koniec obserwacji do 31-12-2018 roku) według płci



Wskaźniki przeżyć mężczyzn i kobiet zdiagnozowanych w miejscowym stadium zaawansowania były wyższe niż w regionalnym czy uogólnionym. Wskaźnik 3-letnich przeżyć


względnych chorych zdiagnozowanych w stadium miejscowym wynosił dla mężczyzn 47%, dla kobiet 60%. Wskaźniki 3-letnich przeżyć względnych chorych zdiagnozowanych

w stadium regionalnym wynosiły 18% dla mężczyzn i 23% dla kobiet; w stadium uogólnionym odpowiednio 4% i 6%. W grupie pacjentów bez określonego stadium

zaawansowania choroby wskaźniki 3-letnich przeżyć względnych wynosiły 19% dla mężczyzn i 30% dla kobiet (rys. 5.2).

Rysunek 5.2

1-roczne, 3-letnie, 5-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w Polsce zdiagnozowanych w latach 2014-2016 w zależności od stadium zaawansowania




Rodzaj leczenia bardzo silnie różnicuje szanse przeżycia pacjentów z rakiem płuca – wskaźniki 3-letnich przeżyć względne pacjentów, którzy otrzymali leczenie radykalne, wynosiły 43% u mężczyzn i 55% u kobiet. Leczenie paliatywne i objawowe pozwoliło uzyskać wyniki na poziomie odpowiednio 6% i 4% u mężczyzn i 8% i 7% u kobiet. W grupie pacjentów ze statusem „skierowani na leczenie” wskaźniki 3-letnich przeżyć względnych wynosiły 21% u mężczyzn i 29% u kobiet, natomiast w grupie pacjentów

bez informacji o rodzaju leczenia odpowiednio 19% i 28% (ryc. 5.3).

Leczenie skojarzone wiązało się z 22% wskaźnikiem 3-letnich przeżyć względnych mężczyzn i 29% kobiet. Dla pacjentów, którzy otrzymywali leczenie nieskojarzone, wskaźniki 3-letnich przeżyć względnych wynosiły 17% u mężczyzn i 24% u kobiet. Wskaźniki te w grupie pacjentów, która nie miała informacji o typie leczenia, wynosiły 15% dla mężczyzn i 23% dla kobiet (rys. 5.4).


Rysunek 5.3

1-letnie, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w Polsce zdiagnozowanych w latach 2014-2016 w zależności od rodzaju leczenia



Rysunek 5.4

1-letnie, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w Polsce zdiagnozowanych w latach 2014-2016 w zależności od typu leczenia




Wskaźniki 1-letnich, 2- i 3-letnich przeżyć względnych u pacjentów (obie płcie) zdiagnozowanych w latach 2014-2016 według województw ilustruje rysunek 5.5. W województwach pomorskim, mazowieckim, podkarpackim i łódzkim wskaźniki przeżyć są najwyższe bez względu na okres przeżycia. Najwyższe wskaźniki 3-letnich przeżyć

względnych zanotowano w województwie pomorskim (22%). Najniższe wskaźniki przeżyć względnych bez względu na oceniany okres przeżycia w województwach świętokrzyskim, dolnośląskim, małopolskim. Najniższym wskaźnikiem 3-letnich przeżyć względnych charakteryzowało się województwo wielkopolskie.

Rysunek 5.5

Wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w Polsce zdiagnozowanych w latach 2014-2016 według województw





Analiza przeżyć według stadium zaawansowania i województw (rys. 5.6) wskazuje, że wśród chorych z miejscowym stadium zaawansowania najwyższe wskaźniki przeżyć zarówno rocznych, 2- i 3-letnich notuje się w województwach mazowieckim, pomorskim i dolnośląskim. Najniższe wskaźniki 3-letnich przeżyć względnych wykazano w województwach podlaskim, opolskim, warmińsko-mazurskim, lubuskim i łódzkim. Różnica między województwem o najwyższym i najniższym wskaźniku przeżyć pacjentów w miejscowym stadium zaawansowania wynosiła 27 punktów procentowych (pp). Wśród pacjentów z regionalnym stadium zaawansowania najwyższe wskaźniki 3-letnich przeżyć względnych notowano w województwach mazowieckim (24%),

pomorskim (24%) i lubuskim (24%); najniższe w województwach małopolskim (15%) i świętokrzyskim (16%). Różnica między województwem o najwyższym i najniższym wskaźniku przeżyć pacjentów z zaawansowaniem regionalnym w momencie diagnozy wynosiła 9 pp. Wskaźniki 3-letnich przeżyć względnych pacjentów w uogólnionym stadium zaawansowania w momencie diagnozy były bardzo niskie (3-6%). Podobnie wskaźniki przeżyć 2-letnich nie przekraczały 10% i nie obserwowano znaczących różnic między województwami. Największe różnice wskaźników obserwowano dla przeżyć rocznych – 8 pp. między województwem podlaskim a małopolskim.

Rysunek 5.6

1-letnie, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w Polsce
zdiagnozowanych w latach 2014-2016 w zależności od stadium zaawansowania





Rodzaj leczenia znacząco wpływa na wskaźniki przeżyć względnych zarówno 1-roczych, jak i 2- i 3-letnich. Najlepsze wyniki leczenia uzyskano w przypadku leczenia radykalnego. Wskaźniki przeżyć względnych 1-roczych pacjentów leczonych radykalnie wahały się od 58% (województwo łódzkie) do 85% (województwo podlaskie). Wskaźniki przeżyć względnych 3-letnich najniższe były w województwie łódzkim (33%), najwyższe w województwie pomorskim (61%). Średnia dla Polski wynosiła 47% w przypadku przeżyć względnych 3-letnich.

Leczenie paliatywne wiązało się z gorszym rokowaniem – 3-letni wskaźnik względny w


Polsce wynosił 7%, a jego wartość w województwach wahała się od 4% (warmińsko-mazurskie) do 14% (podlaskie).


Wskaźnik 3-letnich przeżyć względnych przy leczeniu objawowym wynosił w Polsce 5%, a jego wartość w poszczególnych województwach wahała się od 2% w Opolskiem do 11% w Łódzkiem.

W grupie pacjentów „skierowanych na leczenie” wskaźniki 3-letnich przeżyć względnych były dość wysokie (24% w Polsce): od 17% w województwie zachodniopomorskim do 33% w województwie podlaskim. Brak informacji o rodzaju leczenia uniemożliwia ocenę przeżywalności w tej grupie (rys. 5.7).

Rysunek 5.7

1-letnie, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w Polsce
zdiagnozowanych w latach 2014-2016 w zależności od rodzaju leczenia






Typ leczenia wydaje się wpływać na wskaźniki przeżyć. Leczenie skojarzone wiąże się z większym prawdopodobieństwem przeżycia jednego, dwóch czy trzech lat. Pacjenci leczeni w sposób skojarzony mieli o 13 pp. wyższe przeżycia roczne niż leczeni w sposób nieskojarzony. Najwyższe roczne przeżycia pacjentów leczonych w sposób skojarzony notowano w pomorskim (70%), najniższe w łódzkim (44%). Wskaźniki 3-letnich przeżyć względnych wśród pacjentów leczonych w sposób skojarzony wahały się od 14% w województwie podlaskim do 32% w

województwie zachodniopomorskim i 30% w województwach pomorskim i dolnośląskim. Roczne wskaźniki przeżyć pacjentów leczonych w sposób nieskojarzony wahały się od 38% w województwie dolnośląskim do 49% w województwie podkarpackim (średnia dla Polski wynosi 42%). Wskaźniki 3-letnich przeżyć względnych pacjentów leczonych w sposób nieskojarzony wynosiły od 17% w województwie podkarpackim do 24% w województwie pomorskim (średnia dla Polski 19%) (rys. 5.8).

Rysunek 5.8

1-letnie, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w Polsce zdiagnozowanych w latach 2014-2016 w zależności od typu leczenia



Rysunki 5.9 - 5.72 oraz tabele 5.1 - 5.68 z wynikami (Załącznik 5) przedstawiają 1-letnie, 2-letnie i 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych według województw z podziałem na płeć. Województwa są przedstawione alfabetycznie. Wskaźniki przeżyć w każdym województwie zostały przedstawione ze względu na stadium zaawansowania (miejscowe, regionalne, uogólnione) rodzaj leczenia (radykalne, paliatywne, objawowe, skierowany na leczenie,

brak danych), typ leczenia (skojarzone, nieskojarzone, brak danych).

Analiza przeżyć według województw w niektórych przypadkach nie była możliwa ze względu na małą liczbę przypadków w poszczególnych kategoriach, co sprawiało, że przedział ufności obliczonych wskaźników wskazuje na brak wiarygodności wyniku. Z analizy usunięto z tego względu następujące zestawienia:

Województwo lubuskie

- wskaźniki przeżyć kobiet według stadium zaawansowania - brak danych o stopniu zaawansowania (tab. 5.18);
- wskaźniki przeżyć mężczyzn, kobiet i ogółem według rodzaju leczenia – objawowe (tab. 5.19);
- wskaźniki przeżyć mężczyzn, kobiet i ogółem według rodzaju leczenia – brak danych (tab. 5.19)
- wskaźniki przeżyć mężczyzn i kobiet według typu leczenia – skojarzone (tab. 5.20).

Województwo łódzkie:

- wskaźniki przeżyć mężczyzn i kobiet według typu leczenia – skojarzone (tab. 5.24).

Województwo małopolskie:

- wskaźniki przeżyć kobiet według typu leczenia – skojarzone (tab. 5.28).

Województwo mazowieckie:

- wskaźniki przeżyć mężczyzn, kobiet i ogółem według rodzaju leczenia – brak danych (tab. 5.31),

- wskaźniki przeżyć mężczyzn i kobiet według typu leczenia – brak danych (tab. 5.28).

Województwo opolskie

- wskaźniki przeżyć mężczyzn, kobiet i ogółem według rodzaju leczenia – objawowe (tab. 5.31),
- wskaźniki przeżyć kobiet według typu leczenia – skojarzone (tab. 5.36).

Województwo podlaskie

- wskaźniki przeżyć mężczyzn i kobiet według typu leczenia – leczenie skojarzone (tab. 5.44).

Województwo warmińsko-mazurskie

- wskaźniki przeżyć mężczyzn według rodzaju leczenia – objawowe (tab. 5.59).

Porównanie wartości wskaźników między województwami zawierają rysunki 5.5-5.8, które zostały omówione na początku tego rozdziału. Uzyskane wyniki dla poszczególnych województw mogą być cenną wskazówką dla konsultantów wojewódzkich z zakresu onkologii, a także dla lokalnych władz.

6. Procedury medyczne

Niniejsza część raportu dotycząca procedur medycznych została przygotowana na podstawie wybranego zakresu danych przygotowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia z zachowaniem wymaganych prawem procedur dotyczących ochrony danych osobowych. Do analizy zostali włączeni pacjenci, którzy według kryteriów NFZ rozpoczęli leczenie raka płuca w latach 2016-2018 i nie byli leczeni z powodu raka płuca w latach 2008-2015, co miało zapewnić

uwzględnienie w analizie wyłącznie nowych przypadków zachorowań.

W tabeli 6.1 przedstawiono liczbę i rodzaj świadczeń zdrowotnych zarejestrowanych w bazie NFZ w latach 2016-2018. W ramach leczenia chorych na raka płuca w latach 2016-2018 wykonano ponad 703 tysiące świadczeń na ich rzecz. W dalszej analizie uwzględniono jedynie pacjentów, którzy byli leczeni w ramach ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych (02), leczenia szpitalnego (03) i opieki paliatywnej i hospicyjnej (15).

Tabela 6.1

Liczba i rodzaj świadczeń wykonanych u pacjentów zdiagnozowanych i leczonych z powodu raka płuca (C34) w latach 2016-2018

Kod	Opis	Liczba
01	PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA	138 834
02	AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA SPECJALISTYCZNE	189 848
03	LECZENIE SZPITALNE	253 893
04	OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ	2
05	REHABILITACJA LECZNICZA	1 184
11	ŚWIADCZENIA ODRĘBNI KONTRAKTOWANE	6 748
14	ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE	1 497
15	OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA	94 892
16	RATOWNICTWO MEDYCZNE	16 311
Ogółem		703 209

W latach 2016-2018 w ramach leczenia refundowanego przez NFZ leczono ponad 70 tysięcy pacjentów z rakiem płuca, co średnio daje około 23 tysiące rocznie. Liczba zachorowań według danych NFZ jest zatem zbieżna z danymi, które publikuje Krajowy Rejestr Nowotworów – w 2016 i 2017 roku zarejestrowano odpowiednio 22169 i 21545 zachorowań. Dane za 2018 rok zostaną opublikowane przez Krajowy Rejestr Nowotworów w IV kwartale 2020 roku.

Pacjenci chorzy na nowotwory płuca w większości leczą się w miejscu zamieszkania (tab. 6.2). W kilku województwach, ze względu na umiejscowienie w nich wysokospecjalistycznych szpitali onkologicznych (dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, pomorskie, śląskie i wielkopolskie) widoczny jest napływ chorych z innych województw. Najwięcej pacjentów leczono w województwie mazowieckim i śląskim.

Tabela 6.2

Liczba chorych na raka płuca, u których wykonano świadczenia 02, 03, 15 w latach 2016-2018, według miejsca zamieszkania pacjenta oraz według województwa, w którym wykonano świadczenie

Województwo	Województwo wykonania świadczenia		Województwo zamieszkania pacjenta	
	Liczba	%	Liczba	%
Brak danych	0	0%	891	1%
Dolnośląskie	5 498	8%	4 740	7%
Kujawsko-pomorskie	4 519	6%	4 017	6%
Lubelskie	3 312	5%	3 258	5%
Lubuskie	1 973	3%	1 921	3%
Łódzkie	5 162	7%	5 036	8%
Małopolskie	5 188	7%	4 487	7%
Mazowieckie	9 974	14%	8 930	14%
Opolskie	1 285	2%	1 330	2%
Podkarpackie	2 552	4%	2 390	4%
Podlaskie	1 688	2%	1 574	2%
Pomorskie	5 155	7%	4 762	7%
Śląskie	8 958	13%	8 395	13%

Województwo	Województwo wykonania świadczenia		Województwo zamieszkania pacjenta	
	Liczba	%	Liczba	%
Świętokrzyskie	2 332	3%	2 128	3%
Warmińsko-mazurskie	2 910	4%	2 572	4%
Wielkopolskie	6 174	9%	5 725	9%
Zachodniopomorskie	3 685	5%	3 376	5%
Polska	70 365		65 532	

Ocena częstości wykonywania radykalnych zabiegów chirurgicznych została przedstawiona, przy założeniu, że kategorie

D01, D02 i D03 (tab. 6.3) wyczerpują cały zakres radykalnych zabiegów chirurgicznych.

Tabela 6.3

Chirurgia radykalna (wg kodów świadczeń)

Kod grupy/ Nazwa grupy	Kod produktu/ świadczenia	ICD-9
D01 Złożone zabiegi klatki piersiowej	5.51.01.0004001	32.1 - inne wycięcia oskrzela 32.2 - miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki płuca i oskrzela
D02 Kompleksowe zabiegi klatki piersiowej	5.51.01.0004002	32.291 - miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki płuca nieokreślone inaczej
D03 Duże zabiegi klatki piersiowej	5.51.01.0004003	32.292 - klinowe wycięcie płuca 32.3 - segmentowa resekcja płuca 32.4 - usunięcie płata płucnego 32.41 - lobektomia z wycięciem segmentu drugiego płata 32.49 - lobektomia - inna 32.5 - całkowite usunięcie płuca 32.52 - wycięcie płuca z rozdzieleniem śródpiersia 32.59 - całkowite usunięcie płuca nieokreślone inaczej 32.6 - radykalna resekcja struktur klatki piersiowej 32.9 - inne wycięcia płuc 33.98 - inne operacje na oskrzelu 33.99 - operacje płuc - inne

Liczba i odsetek wykonywanych zabiegów chirurgii radykalnej u pacjentów z rakiem płuca powinny być powiązane z istnieniem w danym województwie dobrego ośrodka torakochirurgicznego. Obserwowany rozkład

wykonanych świadczeń (tab. 6.4) nie potwierdza powyższego założenia. Brak zabiegów chirurgii radykalnej w województwie opolskim (według miejsca zamieszkania) nie budzi zastrzeżeń, jednak w pozostałych

województwach odsetek wykonywanych chirurgii radykalnych według miejsca zamieszkania pacjenta jest znacznie zróżnicowany (od 5,3% w Wielkopolskim do 10,5% w Opolskim). Oznaczałoby to, że w województwie opolskim dwa razy większy odsetek pacjentów z rakiem płuca kwalifikuje się do leczenia radykalnego niż w województwie wielkopolskim. W

województwach dolnośląskim, małopolskim i zachodniopomorskim odsetek wykonanych świadczeń z zakresu chirurgii radykalnej był wyższy niż wynikałoby to z liczby świadczeń w tym zakresie dla pacjentów z tych województw (por. rys. 6.1). W Polsce odsetek pacjentów, u których wykonano radykalną chirurgię, wynosił 7,3%.


Tabela 6.4

Liczba i odsetek wykonanych zabiegów chirurgii radykalnej według województw (w odniesieniu do populacji pacjentów, u których wykonano świadczenia 02, 03, 15)

Województwo	Województwo wykonania świadczenia		Województwo zamieszkania pacjenta	
	Liczba	% wszystkich świadczeń	Liczba	% wszystkich świadczeń
Brak danych	0	0	67	7,5%
Dolnośląskie	477	8,7%	303	6,4%
Kujawsko-pomorskie	406	9,0%	366	9,1%
Lubelskie	175	5,3%	209	6,4%
Lubuskie	71	3,6%	154	8,0%
Łódzkie	470	9,1%	489	9,7%
Małopolskie	479	9,2%	365	8,1%
Mazowieckie	618	6,2%	518	5,8%
Opolskie	0	0,0%	139	10,5%
Podkarpackie	206	8,1%	197	8,2%
Podlaskie	84	5,0%	97	6,2%
Pomorskie	315	6,1%	286	6,0%
Śląskie	551	6,2%	638	7,6%
Świętokrzyskie	200	8,6%	206	9,7%
Warmińsko-mazurskie	107	3,7%	156	6,1%
Wielkopolskie	272	4,4%	301	5,3%
Zachodniopomorskie	382	10,4%	318	9,4%
Polska	4 813	6,8%	4 809	7,3%

Rysunek 6.1

Odsetek wykonanych chirurgii radykalnych u chorych na raka płuca w latach 2016-2018 według województwa zamieszkania pacjenta i według miejsca wykonania świadczenia



Chemioterapia dla pacjentów z rakiem płuca została zdefiniowana jako jedno ze świadczeń

o kodach przedstawionych w tabeli 6.5

Tabela 6.5

Chemioterapia (wg kodów świadczeń)

METODA LECZENIA	Kod produktu/ świadczenia	Opis ICD-9
CHEMIOTERAPIA	5.08.05.0000171 5.08.05.0000172 5.08.05.0000173 5.08.05.0000175 5.08.05.0000176 5.08.07.0000001 5.08.07.0000003 5.08.07.0000004	00.181 - terapia przeciwciałami monoklonalnymi 99.1 - wstrzyknięcie lub wlew substancji leczniczej lub profilaktycznej 99.2 - wstrzyknięcie lub wlew innych substancji leczniczych lub profilaktycznych 99.25 - wstrzyknięcie lub wlew chemioterapeutyku przeciwnowotworowego 99.281 - immunoterapia przeciwnowotworowa 99.29 - wstrzyknięcie/ infuzja innej substancji terapeutycznej lub profilaktycznej 99.2909 - wlew dożylny innej substancji leczniczej
		ICD-10 Z51.1 Cykl chemioterapii przeciwnowotworowej

Odsetek pacjentów, u których wykonano chemioterapię radykalną znacznie różni się między województwami (rys. 6.6) – od 27% w województwie kujawsko-pomorskim do 5% w województwie małopolskim (średnio w Polsce 11% pacjentów leczono stosując chemioterapię sprawozdawaną zgodnie z świadczeniami z tabeli 6.5). Interpretacja tego zjawiska jest

bardzo trudna - może ono wynikać z różnic przyjętych założeń terapeutycznych i sposobów rozliczania z Narodowym Funduszem Zdrowia. Nie ulega wątpliwości, że brak obligatoryjnych standardów leczenia raka płuca może wpływać na decyzje terapeutyczne, a zatem również na ich rozliczanie.

Tabela 6.6

Liczba i odsetek pacjentów, u których wykonano chemioterapię według województw

Województwo	Województwo wykonania świadczenia		Województwo zamieszkania pacjenta	
	Liczba	% wszystkich świadczeń	Liczba	% wszystkich świadczeń
Brak danych	0	0.0%	75	8.4%
Dolnośląskie	380	6.9%	316	6.7%
Kujawsko-pomorskie	1 218	27.0%	1 053	26.2%
Lubelskie	644	19.4%	613	18.8%
Lubuskie	190	9.6%	171	8.9%
Łódzkie	704	13.6%	687	13.6%
Małopolskie	240	4.6%	201	4.5%
Mazowieckie	1 125	11.3%	932	10.4%
Opolskie	95	7.4%	91	6.8%
Podkarpackie	223	8.7%	205	8.6%

Województwo	Województwo wykonania świadczenia		Województwo zamieszkania pacjenta	
	Liczba	% wszystkich świadczeń	Liczba	% wszystkich świadczeń
Podlaskie	304	18.0%	289	18.4%
Pomorskie	397	7.7%	410	8.6%
Śląskie	1 037	11.6%	937	11.2%
Świętokrzyskie	140	6.0%	130	6.1%
Warmińsko-mazurskie	394	13.5%	344	13.4%
Wielkopolskie	678	11.0%	617	10.8%
Zachodniopomorskie	325	8.8%	279	8.3%
Polska	8 094	11.5%	7 350	11.2%

Rysunek 6.2

Częstość wykonywania w latach 2016-2018 chemioterapii u chorych na raka płuca według województwa zamieszkania pacjenta i według miejsca wykonania świadczenia




Tabela 6.7

Radioterapia radykalna (wg kodów świadczeń)

METODA LECZENIA	Kod produktu/ świadczenia	Opis ICD-9
RADIOTERAPIA	5.07.01.0000011	92.247 -Teleradioterapia 4D bramkowana (4D-IGRT) — fotony
	5.07.01.0000012	92.248 - Teleradioterapia 4D adaptacyjna bramkowana (4D-AIGRT) — fotony
	5.07.01.0000013	
	5.07.01.0000022	92.246 - Teleradioterapia 3D z modulacją intensywności dawki (3D-IMRT) — fotony
	5.07.01.0000023	
	5.07.01.0000056	92.292 - Teleradioterapia 3D sterowana obrazem (IGRT) z modulacją intensywności dawki (3D-RotIMRT) – fotony
	5.52.01.0001504	92.291 - Teleradioterapia 3D sterowana obrazem (IGRT) realizowana w oparciu o implanty wewnętrzne - fotony

METODA LECZENIA	Kod produktu/ świadczenia	Opis ICD-9
		92.242 - Teleradioterapia 3D konformalna sterowana obrazem (IGRT) — fotony 92.241 - Teleradioterapia radykalna z planowaniem 3D — fotony 92.222 - Teleradioterapia radykalna 2D — promieniowanie X 92.232 - Teleradioterapia radykalna 2D z zastosowaniem 60Co — promieniowanie gamma 92.240 - Teleradioterapia radykalna 2D — fotony 92.261 - Teleradioterapia 3D stereotaktyczna z modulacją intensywności dawki (3D-SIMRT) — fotony 92.263 - Teleradioterapia 3D stereotaktyczna konformalna (3D-SCRT) — fotony

Radioterapia radykalna dla pacjentów z rakiem płuca została zdefiniowana jako jedno ze świadczeń o kodach przedstawionych w tabeli 6.7.

Około 2,4% pacjentów z rakiem płuca miało zastosowane metody radioterapii radykalnej do leczenia. Odsetek pacjentów (według miejsca zamieszkania) z rakiem płuca, wobec których zastosowano radioterapię radykalną waha się od 0,3% (świętokrzyskie) do 5,7% (małopolskie). Trudno przyjąć, że tak znaczne różnice wynikają ze stanu zdrowia pacjenta. Jeszcze bardziej trudnym do interpretacji jest

obraz wykonywania radioterapii radykalnej według miejsca świadczenia usługi — w województwie świętokrzyskim nie rozliczono ani jednego świadczenia radioterapii radykalnej, w województwie pomorskim rozliczono jedną taką procedurę (tab. 6.8, rys. 6.3). Liczba pacjentów z rakiem płuca, którzy byli leczeni radioterapią radykalną jest niezależna od wielkości województwa — województwa z największą liczbą pacjentów, wobec których zastosowano radioterapię radykalną to kujawsko-pomorskie, małopolskie, śląskie, warmińsko-mazurskie i wielkopolskie).

Tabela 6.8


Liczba i odsetek pacjentów, u których wykonano radioterapię radykalną według województw

Województwo	Województwo wykonania świadczenia		Województwo zamieszkania pacjenta	
	Liczba	% wszystkich świadczeń	Liczba	% wszystkich świadczeń
Brak danych	0	0,0%	8	0,9%
Dolnośląskie	30	0,5%	38	0,8%
Kujawsko-pomorskie	374	8,3%	332	8,3%
Lubelskie	31	0,9%	25	0,8%
Lubuskie	86	4,4%	92	4,8%
Łódzkie	51	1,0%	57	1,1%
Małopolskie	283	5,5%	285	6,4%
Mazowieckie	61	0,6%	79	0,9%
Opolskie	102	7,9%	100	7,5%
Podkarpackie	33	1,3%	48	2,0%
Podlaskie	87	5,2%	81	5,1%
Pomorskie	2	0,0%	75	1,6%
Śląskie	377	4,2%	341	4,1%

Województwo	Województwo wykonania świadczenia		Województwo zamieszkania pacjenta	
	Liczba	% wszystkich świadczeń	Liczba	% wszystkich świadczeń
Świętokrzyskie	0	0,0%	8	0,4%
Warmińsko-mazurskie	115	4,0%	57	2,2%
Wielkopolskie	407	6,6%	396	6,9%
Zachodniopomorskie	14	0,4%	31	0,9%
Polska	2 053	2,9%	2 053	3,1%

Rysunek 6.3

Odsetek wykonanych radioterapii radykalnej u chorych na raka płuca w latach 2016-2018 według województwa zamieszkania pacjenta i według miejsca wykonania świadczenia



U około 40% pacjentów wykonano „inne procedury medyczne”. Terminem tym określono procedury, które nie były procedurami, które uznano za procedury radykalne (tab. 6.3, 6.5 i 6.7). W poszczególnych

województwach odsetek ten wahał się od 29% do 54% bez względu na fakt, czy zliczane były świadczenia według miejsca wykonania, czy według miejsca zamieszkania (rys. 6.4).


Tabela 6.9

Liczba i odsetek pacjentów, u których wykonano inne procedury medyczne według województw

Województwo	Województwo wykonania świadczenia		Województwo zamieszkania pacjenta	
	Liczba	% wszystkich świadczeń	Liczba	% wszystkich świadczeń
Brak danych	0	0,0%	370	41,5%
Dolnośląskie	1 643	29,9%	1 373	29,0%
Kujawsko-pomorskie	1 524	33,7%	1 274	31,7%
Lubelskie	1 027	31,0%	1 003	30,8%
Lubuskie	898	45,5%	804	41,9%
Łódzkie	2 159	41,8%	2 056	40,8%
Małopolskie	2 343	45,2%	1 930	43,0%
Mazowieckie	3 847	38,6%	3 246	36,3%
Opolskie	607	47,2%	532	40,0%
Podkarpackie	1 095	42,9%	1 000	41,8%
Podlaskie	657	38,9%	577	36,7%
Pomorskie	2 711	52,6%	2 403	50,5%
Śląskie	4 209	47,0%	3 744	44,6%
Świętokrzyskie	1 268	54,4%	1 101	51,7%
Warmińsko-mazurskie	1 260	43,3%	991	38,5%
Wielkopolskie	2 205	35,7%	1 927	33,7%
Zachodniopomorskie	1 290	35,0%	1 105	32,7%
Polska	28 743	40,8%	25 436	38,8%

Rysunek 6.4

Odsetek chorych, którym wykonano inne procedury medyczne u chorych na raka płuca w latach 2016-2018 według województwa zamieszkania pacjenta i według miejsca wykonania świadczenia



Wnioski

1. Dane z KRN w zakresie typu i rodzaju leczenia są niespójne między województwami, co może wynikać z różnej praktyki zgłaszania przez lekarzy tych informacji i braku zrozumienia dla zasadności gromadzenia tych danych.
2. Ocenę zaawansowania w momencie rozpoznania i leczenia chorych na raka płuca w Polsce należałoby ograniczyć jedynie do tych województw, w których kategorie „brak danych” lub inne uniemożliwiające ocenę (np. skierowani na leczenie) nie przekraczają 20-30% zbioru. Rekomendacją należałoby objąć województwa dolnośląskie, opolskie, podkarpackie i wielkopolskie.
3. Typ leczenia (skojarzone, nieskojarzone) nieznacznie wpływa na szansę przeżycia - 5 punktów procentowych u obu płci na korzyść leczenia skojarzonego.
4. Dane pozyskane z Narodowego Funduszu Zdrowia nie pozwalają na ocenę częstości zastosowanego radykalnego leczenia pacjentów z rakiem płuca, gdyż wyjaśnienie różnic wojewódzkich napotyka szereg trudności.

Załącznik 1.

Adresat: MINISTERSTWO ZDROWIA; Wojewódzkie Biuro Rejestracji Nowotworów
Przekazać w terminach przewidzianych w programie badań statystycznych statystyki publicznej

Numer w KRN	
MZ/N-1a KARTA ZGŁOSZENIA NOWOTWORU ZŁOŚLIWEGO	
1. Nazwa i adres jednostki—pieczęć z numerem REGON	2. REGON (cz. I resort. kodu identyf.)
3. PESEL	4. Data urodzenia
5. Płeć ☐ mężczyzna ☐ kobieta	6. Obywatelstwo ☐ polskie ☐ obcokrajowiec
7. Nazwisko	8. Imię
9. Miejscowość	10. Kod pocztowy
11. Ulica, nr domu, nr mieszkania	12. Kod TERYT
13. Województwo	14. Powiat
15. Gmina	16. Ukończona szkoła ☐ bez wykształcenia ☐ podstawowa ☐ gimnazjum ☐ zasadnicza zawodowa ☐ średnia ☐ policealna ☐ wyższa
17. DATA ROZPOZNANIA	18. DATA PRZYJĘCIA
19. do ambulatorium	20. do szpitala
21. Data wypisu	22. DATA ZGONU
23. Miejsce zgonu	24. Przyczyna zgonu
25. Kod przyczyny zgonu ICD-10	26. Kod przyczyny zgonu ICD-10
27. Rozpoznanie histopatologiczne	28. Rozpoznanie histopatologiczne
29. Opis i lokalizacja nowotworu:	30. Opis i lokalizacja nowotworu:
31. Nowotwór ☐ pojedynczy ☐ mnogi ☐ przerzut	32. Miejsce przerzutu:
33. Data przerzutu	34. Strona ciała ☐ prawa ☐ lewa ☐ obie strony
35. Kod zaawansowania TNM (7 rewizja)	36. Inne klasyfikacje zaawansowania
37. Inne klasyfikacje zaawansowania	38. Wynik
39. Inne podstawy rozpoznania	40. Leczenie skojarzone
41. Dla raka piersi (C50, D05)	42. Leczenie nieskojarzone
43. Rodzaj leczenia ☐ radykalne ☐ paliatywne ☐ objawowe ☐ skierowany na leczenie ☐ brak zgody na leczenie	44. Data wypełnienia
45. Data wypełnienia	46. Nr PWZ lekarza
47. Identyfikator osoby wprowadzającej	48. Podpis i pieczęć lekarza

Załącznik 2.

Typy morfologiczne nowotworów płuca (C34) włączone do analizy (zgodnie z klasyfikacją ICD-O-3)

1. Raki płaskonabłonkowe

- 8050 Rak brodawkowaty (brodawkowy), BNO
- 8051 Rak brodawkowaty, BNO
- 8052 Rak płaskonabłonkowy brodawkowaty
- 8070 Rak płaskonabłonkowy, BNO
- 8071 Rak płaskonabłonkowy, typ rogowaciejący, BNO
- 8072 Rak płaskonabłonkowy wielkomórkowy, typ nierogowaciejący, BNO
- 8073 Rak płaskonabłonkowy drobnkomórkowy, typ nierogowaciejący
- 8074 Rak płaskonabłonkowy, typ wrzecionowatokomórkowy
- 8075 Rak płaskonabłonkowy, gruczołowaty
- 8076 Rak płaskonabłonkowy mikroinwazyjny
- 8083 Rak płaskonabłonkowy podstawnokomórkowopodobny, basaloidny
- 8084 Rak płaskonabłonkowy, typ jasnokomórkowy

2. Rak nie drobnkomórkowy

- 8046 Rak nie drobnkomórkowy (C34)

3. Gruczołakoraki

- 8140 Gruczołakorak, BNO
- 8141 Gruczołakorak włóknisty
- 8211 Gruczołakorak cewkowy
- 8230 Rak lity, BNO
- 8231 Rak prosty
- 8250 Gruczołakorak oskrzelikowo-pęcherzykowy, BNO
- 8251 Gruczołakorak pęcherzykowy
- 8252 Gruczołakorak oskrzelikowo-pęcherzykowy, nieśluzowy
- 8253 Gruczołakorak oskrzelikowo-pęcherzykowy, śluzowy
- 8254 Gruczołakorak oskrzelikowo-pęcherzykowy, typ mieszany śluzowy i nieśluzowy
- 8255 Gruczołakorak mieszany z podtypami
- 8260 Gruczołakorak brodawkowaty, BNO
- 8310 Gruczołakorak jasnokomórkowy, BNO
- 8323 Gruczołakorak z komórek mieszanych
- 8430 Rak śluzowonaskórkowy
- 8480 Gruczołakorak śluzowy
- 8481 Gruczołakorak wydzielający śluz
- 8482 Gruczołakorak śluzowy, typ wewnętrzzyjkowy
- 8490 Gruczołakorak z komórek sygnetowych
- 8550 Rak zrazikowokomórkowy
- 8551 Torbielakogruczołakorak zrazikowokomórkowy
- 8560 Rak gruczołowopłaskonabłonkowy
- 8570 Gruczołakorak z metaplastją płaskonabłonkową
- 8571 Gruczołakorak z metaplastją chrzęstną i kostną
- 8572 Gruczołakorak z metaplastją wrzecionowatokomórkową

4. Rak drobnkomórkowy

- 8041 Rak drobnkomórkowy, BNO
- 8042 Rak owsianokomórkowy
- 8043 Rak drobnkomórkowy z komórek wrzecionowatych

- 8044 Rak drobnokomórkowy z komórek pośrednich
- 8045 Rak drobnokomórkowy złożony

5. Rak wielkokomórkowy

- 8012 Rak wielkokomórkowy, BNO
- 8013 Rak neuroendokrynnny wielkokomórkowy
- 8014 Rak wielkokomórkowy z fenotypem rabdoidnym
- 8015 Rak z komórek szklitych
- 8020 Rak niezróżnicowany, BNO
- 8021 Rak anaplastyczny, BNO
- 8022 Rak wielopostaciowy
- 8030 Rak olbrzymiokomórkowy i wrzecionowatokomórkowy
- 8031 Rak olbrzymiokomórkowy

6. Inne określone nowotwory z zakresu 8012-95-81 z wykluczeniem kodów z pozycji 1-4

- 8033 Rak rzekomomięsakowy
- 8120 Rak przejściowokomórkowy, BNO
- 8122 Rak przejściowokomórkowy, typ wrzecionowatokomórkowy
- 8123 Rak bazaloidalny/bazaloidowy
- 8200 Rak gruczołowato-torbielowaty
- 8240 Rakowiak, BNO (z wyjątkiem wyrostka robaczkowego M8240/1)
- 8241 Rakowiak z komórek enterochromafinowych
- 8244 Rakowiak złożony
- 8245 Gruczolakorakowiak
- 8246 Rak neuroendokrynnny, BNO
- 8249 Rakowiak atypowy
- 8574 Rak z różnicowaniem neuroendokrynnym
- 8575 Rak metaplastyczny, BNO
- 8720 Czerniak złośliwy, BNO (z wyjątkiem czerniaka młodzieńczego M-8770/3)
- 8800 Mięsak, BNO
- 8801 Mięsak wrzecionowatokomórkowy
- 8802 Mięsak olbrzymiokomórkowy (z wyjątkiem kości M9250/3)
- 8803 Mięsak drobnokomórkowy
- 8804 Mięsak nabłonkowy
- 8805 Mięsak niezróżnicowany
- 8806 Guz desmoplastyczny drobnookrągłokomórkowy
- 8810 Włókniakomięsak, BNO
- 8811 Włókniakośluzakomięsak
- 8815 Guz włóknisty pojedynczy, złośliwy
- 8830 Guz histiocytarny włóknisty złośliwy
- 8854 Tłuszczakomięsak wielopostaciowy
- 8890 Mięśniakomięsak gładkokomórkowy, BNO
- 8933 Gruczolakomięsak
- 8940 Guz mieszany, złośliwy, BNO
- 8972 Nowotwór płodowy płuc (C34. _)
- 8973 Nowotwór płodowy opłucnowopłucny
- 8980 Mięsakorak, BNO
- 8990 Złośliwy guz mezenchymalny

9040	Mięsak maziówkowy, BNO
9050	Międzybłoniak złośliwy
9080	Potworniak złośliwy, BNO
9120	Mięsak naczyń krwionośnych (naczyniakomięsak krwionośny)
9133	Śródbłoniak nabłonkowy złośliwy
9140	Mięsak Kaposiego
9150	Obłoniak złośliwy
9538	Oponiak brodawkowy
9580	Guz ziarnistokomórkowy złośliwy

7. Nowotwory niedokładnie określone

8000	Nowotwór, złośliwy
8001	Komórki nowotworu złośliwego
8002	Guz złośliwy, typ drobnokomórkowy
8003	Guz złośliwy, typ olbrzymiokomórkowy
8004	Guz złośliwy, typ wrzecionowatokomórkowy
8010	Rak, BNO
8011	Nabłoniak, złośliwy

Załącznik 3.

Tabele częstości stadium zaawansowania vs typ leczenia według województw

Tabela 3.4

Typ leczenia chorych na raka płuca zgłoszonych do KRN w latach 2014-2016 w zależności od stadium zaawansowania wg województw

Województwo dolnośląskie	Miejscowe		Regionalne		Uogólnione		Brak danych	
liczba ogółem	880		1338		2287		1055	
Leczenie skojarzone	91	10%	159	12%	128	6%	42	4%
Leczenie nieskojarzone	711	81%	1061	79%	1948	85%	826	78%
Brak danych	78	9%	118	9%	211	9%	187	18%

Województwo kujawsko-pomorskie	Miejscowe		Regionalne		Uogólnione		Brak danych	
liczba ogółem	699		1286		2035		838	
Leczenie skojarzone	75	11%	134	10%	136	7%	79	9%
Leczenie nieskojarzone	622	89%	1146	89%	1886	93%	755	90%
Brak danych	2	0%	6	0%	13	1%	4	0%

Województwo lubelskie	Miejscowe		Regionalne		Uogólnione		Brak danych	
liczba ogółem	218		672		1013		1417	
Leczenie skojarzone	25	11%	131	19%	62	6%	48	3%
Leczenie nieskojarzone	127	58%	366	54%	593	59%	681	48%
Brak danych	66	30%	175	26%	358	35%	688	49%

Województwo lubuskie	Miejscowe		Regionalne		Uogólnione		Brak danych	
liczba ogółem	406		505		729		115	
Leczenie skojarzone	17	4%	24	5%	14	2%	5	4%
Leczenie nieskojarzone	232	57%	387	77%	539	74%	35	30%
Brak danych	157	39%	94	19%	176	24%	75	65%

Województwo łódzkie	Miejscowe		Regionalne		Uogólnione		Brak danych	
liczba ogółem	1153		646		1249		1382	
Leczenie skojarzone	27	2%	45	7%	60	5%	37	3%
Leczenie nieskojarzone	1042	90%	524	81%	995	80%	988	71%
Brak danych	84	7%	77	12%	194	16%	357	26%

Województwo małopolskie	Miejscowe		Regionalne		Uogólnione		Brak danych	
liczba ogółem	808		1148		2037		872	
Leczenie skojarzone	49	6%	77	7%	78	4%	23	3%
Leczenie nieskojarzone	431	53%	671	58%	1026	50%	259	30%
Brak danych	328	41%	400	35%	933	46%	590	68%

Województwo mazowieckie	Miejscowe		Regionalne		Uogólnione		Brak danych	
liczba ogółem	674		2163		3612		1586	
Leczenie skojarzone	12	2%	91	4%	71	2%	23	1%
Leczenie nieskojarzone	657	97%	2066	96%	3527	98%	1539	97%
Brak danych	5	1%	6	0%	14	0%	24	2%

Województwo opolskie	Miejscowe		Regionalne		Uogólnione		Brak danych	
liczba ogółem	324		648		579		2	
Leczenie skojarzone	7	2%	23	4%	12	2%	0	0%
Leczenie nieskojarzone	219	68%	527	81%	516	89%	1	50%
Brak danych	98	30%	98	15%	51	9%	1	50%

Województwo podkarpackie	Miejscowe		Regionalne		Uogólnione		Brak danych	
liczba ogółem	564		757		1195		325	
Leczenie skojarzone	30	5%	65	9%	76	6%	4	1%
Leczenie nieskojarzone	419	74%	517	68%	733	61%	136	42%
Brak danych	115	20%	175	23%	386	32%	185	57%

Województwo podlaskie	Miejscowe		Regionalne		Uogólnione		Brak danych	
liczba ogółem	332		515		705		3	
Leczenie skojarzone	9	3%	32	6%	17	2%	0	0%
Leczenie nieskojarzone	249	75%	411	80%	625	89%	1	33%
Brak danych	74	22%	72	14%	63	9%	2	67%

Województwo pomorskie	Miejscowe		Regionalne		Uogólnione		Brak danych	
liczba ogółem	960		1147		2196		509	
Leczenie skojarzone	37	4%	80	7%	53	2%	9	2%
Leczenie nieskojarzone	758	79%	820	71%	1570	71%	233	46%
Brak danych	165	17%	247	22%	573	26%	267	52%

Województwo śląskie	Miejscowe		Regionalne		Uogólnione		Brak danych	
liczba ogółem	1259		2140		3098		1874	
Leczenie skojarzone	24	2%	99	5%	114	4%	28	1%
Leczenie nieskojarzone	704	56%	1119	52%	1792	58%	875	47%
Brak danych	531	42%	922	43%	1192	38%	971	52%

Województwo świętokrzyskie	Miejscowe		Regionalne		Uogólnione		Brak danych	
liczba ogółem	389		498		935		567	
Leczenie skojarzone	24	6%	28	6%	45	5%	10	2%
Leczenie nieskojarzone	258	66%	353	71%	632	68%	317	56%
Brak danych	107	28%	117	23%	258	28%	240	42%

Województwo warmińsko-mazurskie	Miejscowe		Regionalne		Uogólnione		Brak danych	
liczba ogółem	712		732		1138		520	
Leczenie skojarzone	37	5%	73	10%	62	5%	23	4%
Leczenie nieskojarzone	448	63%	446	61%	698	61%	233	45%
Brak danych	227	32%	213	29%	378	33%	264	51%

Województwo wielkopolskie	Miejscowe		Regionalne		Uogólnione		Brak danych	
liczba ogółem	643		1461		3076		973	
Leczenie skojarzone	32	5%	133	9%	127	4%	9	1%
Leczenie nieskojarzone	427	66%	985	67%	1908	62%	313	32%
Brak danych	184	29%	343	23%	1041	34%	651	67%

Województwo zachodniopomorskie	Miejscowe		Regionalne		Uogólnione		Brak danych	
liczba ogółem	438		662		1142		1242	
Leczenie skojarzone	77	18%	87	13%	98	9%	118	10%
Leczenie nieskojarzone	211	48%	346	52%	676	59%	666	54%
Brak danych	150	34%	229	35%	368	32%	458	37%

Załącznik 4.

Tabele częstości stadium zaawansowania vs rodzaj leczenia według województw

Tabela 4.4

Rodzaj leczenia w zależności od stadium zaawansowania u chorych na raka płuca zdiagnozowanych w latach 2014-2016 według województw

Województwo dolnośląskie (02)	Miejscowe		Regionalne		Uogólnione		Brak danych	
liczba ogółem	880		1338		2287		1055	
brak danych	34	4%	56	4%	84	4%	36	3%
brak zgody na leczenie	4	0%	6	0%	7	0%	13	1%
objawowe	73	8%	162	12%	491	21%	332	31%
paliatywne	116	13%	484	36%	1185	52%	391	37%
radikalne	512	58%	348	26%	175	8%	97	9%
skierowanie na leczenie	141	16%	282	21%	345	15%	186	18%

Województwo kujawsko-pomorskie (04)	Miejscowe		Regionalne		Uogólnione		Brak danych	
liczba ogółem	699		1286		2035		838	
brak danych	4	1%	8	1%	5	0%	2	0%
brak zgody na leczenie	1	0%	2	0%	9	0%	3	0%
objawowe	21	3%	61	5%	334	16%	115	14%
paliatywne	67	10%	428	33%	998	49%	314	37%
radikalne	228	33%	137	11%	66	3%	63	8%
skierowanie na leczenie	378	54%	650	51%	623	31%	341	41%

Województwo lubelskie (06)	Miejscowe		Regionalne		Uogólnione		Brak danych	
liczba ogółem	218		672		1013		1417	
brak danych	63	29%	181	27%	271	27%	624	44%
brak zgody na leczenie	1	0%	6	1%	7	1%	5	0%
objawowe	19	9%	89	13%	200	20%	146	10%
paliatywne	20	9%	126	19%	439	43%	113	8%
radikalne	96	44%	211	31%	46	5%	246	17%
skierowanie na leczenie	19	9%	59	9%	50	5%	283	20%

Województwo lubuskie (08)	Miejscowe		Regionalne		Uogólnione		Brak danych	
liczba ogółem	406		505		729		115	
brak danych	7	2%	10	2%	19	3%	14	12%
brak zgody na leczenie	1	0%	1	0%	10	1%	1	1%
objawowe	12	3%	16	3%	161	22%	3	3%
paliatywne	35	9%	175	35%	316	43%	18	16%
radikalne	138	34%	104	21%	20	3%	11	10%
skierowanie na leczenie	213	52%	199	39%	203	28%	68	59%

Województwo łódzkie (10)	Miejscowe		Regionalne		Uogólnione		Brak danych	
liczba ogółem	1153		646		1249		1382	
brak danych	59	5%	97	15%	123	10%	316	23%
brak zgody na leczenie	3	0%	2	0%	2	0%	5	0%
objawowe	159	14%	79	12%	269	22%	224	16%
paliatywne	81	7%	100	15%	409	33%	162	12%
radikalne	465	40%	175	27%	182	15%	206	15%
skierowanie na leczenie	386	33%	193	30%	264	21%	469	34%

Województwo małopolskie (12)	Miejscowe		Regionalne		Uogólnione		Brak danych	
liczba ogółem	808		1148		2037		872	
brak danych	232	29%	217	19%	398	20%	246	28%
brak zgody na leczenie	6	1%	7	1%	13	1%	8	1%
objawowe	34	4%	113	10%	530	26%	212	24%
paliatywne	60	7%	252	22%	607	30%	123	14%
radikalne	173	21%	115	10%	24	1%	51	6%
skierowanie na leczenie	303	38%	444	39%	465	23%	232	27%

Województwo mazowieckie (14)	Miejscowe		Regionalne		Uogólnione		Brak danych	
liczba ogółem	674		2163		3612		1586	
brak danych	8	1%	7	0%	4	0%	13	1%
brak zgody na leczenie	0	0%	7	0%	17	0%	6	0%
objawowe	21	3%	169	8%	1276	35%	214	13%
paliatywne	5	1%	599	28%	1523	42%	109	7%
radikalne	464	69%	751	35%	24	1%	119	8%
skierowanie na leczenie	176	26%	630	29%	768	21%	1125	71%

Województwo opolskie (16)	Miejscowe		Regionalne		Uogólnione		Brak danych	
liczba ogółem	324		648		579		2	
brak danych	0	0%	2	0%	1	0%	0	0%
brak zgody na leczenie	1	0%	2	0%	1	0%	0	0%
objawowe	9	3%	76	12%	177	31%	0	0%
paliatywne	38	12%	232	36%	292	50%	0	0%
radikalne	176	54%	232	36%	55	9%	1	50%
skierowanie na leczenie	100	31%	104	16%	53	9%	1	50%

Województwo podkarpackie (18)	Miejscowe		Regionalne		Uogólnione		Brak danych	
liczba ogółem	564		757		1195		325	
brak danych	5	1%	15	2%	12	1%	10	3%
brak zgody na leczenie	2	0%	3	0%	8	1%	1	0%
objawowe	74	13%	158	21%	400	33%	100	31%
paliatywne	77	14%	233	31%	385	32%	47	14%
radikalne	234	41%	111	15%	81	7%	23	7%
skierowanie na leczenie	172	30%	237	31%	309	26%	144	44%

Województwo podlaskie (20)	Miejscowe		Regionalne		Uogólnione		Brak danych	
liczba ogółem	332		515		705		3	
brak danych	1	0%	0	0%	2	0%	0	0%
brak zgody na leczenie	0	0%	6	1%	6	1%	0	0%
objawowe	38	11%	67	13%	225	32%	0	0%
paliatywne	103	31%	329	64%	396	56%	1	33%
radikalne	98	30%	33	6%	7	1%	0	0%
skierowanie na leczenie	92	28%	80	16%	69	10%	2	67%

Województwo pomorskie (22)	Miejscowe		Regionalne		Uogólnione		Brak danych	
liczba ogółem	960		1147		2196		509	
brak danych	23	2%	49	4%	92	4%	26	5%
brak zgody na leczenie	2	0%	3	0%	16	1%	3	1%
objawowe	97	10%	164	14%	496	23%	100	20%
paliatywne	20	2%	143	12%	609	28%	58	11%
radikalne	335	35%	182	16%	32	1%	36	7%
skierowanie na leczenie	483	50%	606	53%	951	43%	286	56%

Województwo śląskie (24)	Miejscowe		Regionalne		Uogólnione		Brak danych	
liczba ogółem	1259		2140		3098		1874	
brak danych	170	14%	368	17%	440	14%	444	24%
brak zgody na leczenie	2	0%	10	0%	17	1%	20	1%
objawowe	44	3%	157	7%	531	17%	234	12%
paliatywne	138	11%	694	32%	1434	46%	491	26%
radikalne	441	35%	308	14%	62	2%	158	8%
skierowanie na leczenie	464	37%	603	28%	614	20%	527	28%

Województwo świętokrzyskie (26)	Miejscowe		Regionalne		Uogólnione		Brak danych	
liczba ogółem	389		498		935		567	
brak danych	151	39%	165	33%	267	29%	240	42%
brak zgody na leczenie	4	1%	3	1%	8	1%	8	1%
objawowe	24	6%	58	12%	176	19%	87	15%
paliatywne	34	9%	133	27%	347	37%	116	20%
radikalne	80	21%	40	8%	28	3%	17	3%
skierowanie na leczenie	96	25%	99	20%	109	12%	99	17%

Województwo warmińsko-mazurskie (28)	Miejscowe		Regionalne		Uogólnione		Brak danych	
liczba ogółem	712		732		1138		520	
brak danych	74	10%	68	9%	116	10%	113	22%
brak zgody na leczenie	3	0%	3	0%	10	1%	7	1%
objawowe	43	6%	49	7%	162	14%	72	14%
paliatywne	44	6%	99	14%	288	25%	67	13%
radikalne	226	32%	142	19%	104	9%	47	9%
skierowanie na leczenie	322	45%	371	51%	458	40%	214	41%

Województwo wielkopolskie (30)	Miejscowe		Regionalne		Uogólnione		Brak danych	
liczba ogółem	643		1461		3076		973	
brak danych	50	8%	141	10%	150	5%	140	14%
brak zgody na leczenie	6	1%	2	0%	15	0%	13	1%
objawowe	32	5%	125	9%	931	30%	247	25%
paliatywne	37	6%	493	34%	1535	50%	173	18%
radikalne	364	57%	482	33%	108	4%	62	6%
skierowanie na leczenie	154	24%	218	15%	337	11%	338	35%


Województwo zachodniopomorskie (32)	Miejscowe		Regionalne		Uogólnione		Brak danych	
liczba ogółem	438		662		1142		1242	
brak danych	44	10%	48	7%	69	6%	167	13%
brak zgody na leczenie	0	0%	3	0%	5	0%	6	0%
objawowe	11	3%	30	5%	137	12%	120	10%
paliatywne	40	9%	153	23%	487	43%	284	23%
radikalne	197	45%	140	21%	51	4%	230	19%
skierowanie na leczenie	146	33%	288	44%	393	34%	435	35%

Załącznik 5.

Wskaźniki przeżyć według względnych chorych na raka płuca według województw (diagnoza w latach 2014-2016, koniec obserwacji do 31-12-2018 roku)


Rysunek 5.9

1-roczne, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w **województwie dolnośląskim**




Rysunek 5.10

1-roczne, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w **województwie dolnośląskim** w zależności od **stadium zaawansowania**




Rysunek 5.11

1-letnie, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w województwie dolnośląskim w zależności od rodzaju leczenia




Rysunek 5.12

1-letnie, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w województwie dolnośląskim w zależności od typu leczenia




Rysunek 5.13

1-letnie, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w **województwie kujawsko-pomorskim**




Rysunek 5.14

1-letnie, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w **województwie kujawsko-pomorskim** w zależności od **stadium zaawansowania**




Rysunek 5.15

1-roczone, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w **województwie kujawsko-pomorskim** w zależności od **rodzaju leczenia**




Rysunek 5.16

1-roczone, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w **województwie kujawsko-pomorskim** w zależności od **typu leczenia**




Rysunek 5.17

1-letnie, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w **województwie lubelskim**




Rysunek 5.18

1-letnie, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w **województwie lubelskim** w zależności od **stadium zaawansowania**




Rysunek 5.19

1-letnie, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w **województwie lubelskim** w zależności od **rodzaju leczenia**




Rysunek 5.20

1-letnie, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w **województwie lubelskim** w zależności od **typu leczenia**




Rysunek 5.21

1-letnie, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w **województwie lubuskim**




Rysunek 5.22

1-letnie, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w **województwie lubuskim** w zależności od **stadium zaawansowania**




Rysunek 5.23

1-letnie, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w **województwie lubuskim** w zależności od **rodzaju leczenia**



Rysunek 5.24


1-letnie, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w **województwie lubuskim** w zależności od **typu leczenia**



*Mała liczba przypadków - niska wiarygodność wyników


Rysunek 5.25

1-letnie, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w **województwie łódzkim**




Rysunek 5.26

1-letnie, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w **województwie łódzkim** w zależności od **stadium zaawansowania**




Rysunek 5.27

1-roczone, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w **województwie łódzkim** w zależności od **rodzaju leczenia**




Rysunek 5.28

1-roczone, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w **województwie łódzkim** w zależności od **typu leczenia**




Rysunek 5.29

1-letnie, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w **województwie małopolskim**




Rysunek 5.30

1-letnie, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w **województwie małopolskim** w zależności od **stadium zaawansowania**




Rysunek 5.31

1-letnie, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w **województwie małopolskim** w zależności od **rodzaju leczenia**




Rysunek 5.32

1-letnie, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w **województwie małopolskim** w zależności od **typu leczenia**




Rysunek 5.33

1-roczne, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w **województwie mazowieckim**




Rysunek 5.34

1-roczne, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w **województwie mazowieckim** w zależności od **stadium zaawansowania**




Rysunek 5.35

1-roczne, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w **województwie mazowieckim** w zależności od **rodzaju leczenia**




Rysunek 5.36

1-roczne, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w **województwie mazowieckim** w zależności od **typu leczenia**




Rysunek 5.37

1-letnie, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w **województwie opolskim**




Rysunek 5.38

1-letnie, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w **województwie opolskim** w zależności od **stadium zaawansowania**




Rysunek 5.39

1-letnie, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w **województwie opolskim** w zależności od **rodzaju leczenia**



Rysunek 5.40


1-letnie, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w **województwie opolskim** w zależności od **typu leczenia**



*Mała liczba przypadków - niska wiarygodność wyników


Rysunek 5.41

1-letnie, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w **województwie podkarpackim**




Rysunek 5.42

1-letnie, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w **województwie podkarpackim** w zależności od **stadium zaawansowania**




Rysunek 5.43

1-letnie, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w **województwie podkarpackim** w zależności od **rodzaju leczenia**




Rysunek 5.44

1-letnie, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w **województwie podkarpackim** w zależności od **typu leczenia**




Rysunek 5.45

1-roczne, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w **województwie podlaskim**




Rysunek 5.46

1-roczne, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w **województwie podlaskim** w zależności od **stadium zaawansowania**




Rysunek 5.47

1-letnie, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w **województwie podlaskim** w zależności od **rodzaju leczenia**



Rysunek 5.48


1-letnie, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w **województwie podlaskim** w zależności od **typu leczenia**



*Mała liczba przypadków - niska wiarygodność wyników


Rysunek 5.49

1-letnie, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w **województwie pomorskim**




Rysunek 5.50

1-letnie, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w **województwie pomorskim** w zależności od **stadium zaawansowania**




Rysunek 5.51

1-letnie, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w **województwie pomorskim** w zależności od **rodzaju leczenia**




Rysunek 5.52

1-letnie, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w **województwie pomorskim** w zależności od **typu leczenia**




Rysunek 5.53

1-letnie, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w **województwie śląskim**




Rysunek 5.54

1-letnie, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w **województwie śląskim** w zależności od **stadium zaawansowania**




Rysunek 5.55

1-letnie, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w **województwie śląskim** w zależności od **rodzaju leczenia**




Rysunek 5.56

1-letnie, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w **województwie śląskim** w zależności od **typu leczenia**




Rysunek 5.57

1-roczne, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w **województwie świętokrzyskim**




Rysunek 5.58

1-roczne, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w **województwie świętokrzyskim** w zależności od **stadium zaawansowania**




Rysunek 5.59

1-letnie, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w **województwie świętokrzyskim** w zależności od **rodzaju leczenia**




Rysunek 5.60

1-letnie, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w **województwie świętokrzyskim** w zależności od **typu leczenia**




Rysunek 5.61

1-roczne, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w **województwie warmińsko-mazurskim**




Rysunek 5.62

1-roczne, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w **województwie warmińsko-mazurskim** w zależności od **stadium zaawansowania**




Rysunek 5.63

1-letnie, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w **województwie warmińsko-mazurskim** w zależności od **rodzaju leczenia**




Rysunek 5.64

1-letnie, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w **województwie warmińsko-mazurskim** w zależności od **typu leczenia**




Rysunek 5.65

1-roczne, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w **województwie wielkopolskim**




Rysunek 5.66

1-roczne, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w **województwie wielkopolskim** w zależności od **stadium zaawansowania**




Rysunek 5.67

1-letnie, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w **województwie wielkopolskim** w zależności od **rodzaju leczenia**




Rysunek 5.68

1-letnie, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w **województwie wielkopolskim** w zależności od **typu leczenia**




Rysunek 5.69

1-letnie, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w **województwie zachodniopomorskim**




Rysunek 5.70

1-letnie, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w **województwie zachodniopomorskim** w zależności od **stadium zaawansowania**



Rysunek 5.71

1-roczone, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w **województwie zachodniopomorskim** w zależności od **rodzaju leczenia**



Rysunek 5.72

1-roczone, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w **województwie zachodniopomorskim** w zależności od **typu leczenia**




Tabela 5.1

1-letnie, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca zdiagnozowanych w Polsce latach 2014-2016

	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	44168	37,1%	37,8%	37,4%	38,3%
2-letnie	16392	21,2%	22,1%	21,7%	22,5%
3-letnie	9378	15,7%	16,7%	16,3%	17,1%
	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	22869	44,6%	45,2%	44,5%	45,8%
2-letnie	10193	29,0%	29,8%	29,2%	30,4%
3-letnie	6634	22,8%	23,7%	23,1%	24,3%
	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	67037	39,7%	40,4%	40,0%	40,7%
2-letnie	26585	23,9%	24,8%	24,4%	25,1%
3-letnie	16012	18,1%	19,1%	18,8%	19,4%

Tabela 5.2

1-letnie, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w Polsce w zależności od stadium zaawansowania

Stadium miejscowe	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	6606	69,7%	71,1%	69,9%	72,2%
2-letnie	4602	53,2%	55,4%	54,1%	56,7%
3-letnie	3515	44,5%	47,4%	46,0%	48,7%
Stadium miejscowe	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	3843	77,4%	78,4%	77,0%	79,8%
2-letnie	2975	65,9%	67,7%	66,1%	69,2%
3-letnie	2534	57,7%	60,0%	58,3%	61,8%
Stadium miejscowe	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	10449	73%	74%	73%	75%
2-letnie	7577	58%	60%	59%	61%
3-letnie	6049	49%	52%	51%	53%

Stadium regionalne	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	10963	46,2%	47,1%	46,1%	48,1%
2-letnie	5062	24,6%	25,6%	24,7%	26,4%
3-letnie	2693	16,9%	17,9%	17,1%	18,7%
Stadium regionalne	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	5347	52,9%	53,6%	52,2%	54,9%
2-letnie	2829	31,7%	32,5%	31,2%	33,8%
3-letnie	1692	22,5%	23,4%	22,1%	24,6%
Stadium regionalne	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	16310	48,4%	49,2%	48,4%	50,0%
2-letnie	7891	26,9%	27,9%	27,1%	28,6%
3-letnie	4385	18,7%	19,7%	19,1%	20,4%

Stadium uogólnione	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	17895	20,0%	20,4%	19,8%	21,0%
2-letnie	3574	6,6%	6,9%	6,5%	7,2%
3-letnie	1180	3,3%	3,5%	3,2%	3,8%
Stadium uogólnione	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	9118	25,1%	25,4%	24,5%	26,3%
2-letnie	2285	9,6%	9,8%	9,2%	10,5%
3-letnie	874	5,5%	5,8%	5,3%	6,3%
Stadium uogólnione	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	27013	21,7%	22,1%	21,6%	22,6%
2-letnie	5859	7,6%	7,9%	7,5%	8,2%
3-letnie	2054	4,1%	4,3%	4,0%	4,6%

Brak danych	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	8704	36,2%	37,0%	35,9%	38,0%
2-letnie	3154	22,9%	23,8%	22,9%	24,8%
3-letnie	1990	18,0%	19,2%	18,3%	20,0%
Brak danych	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	4561	46,1%	46,8%	45,3%	48,3%
2-letnie	2104	33,6%	34,6%	33,2%	36,1%
3-letnie	1534	28,5%	29,8%	28,4%	31,3%

Brak danych	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	13265	39,6%	40,4%	39,5%	41,2%
2-letnie	5258	26,6%	27,6%	26,8%	28,4%
3-letnie	3524	21,6%	22,9%	22,1%	23,6%

Tabela 5.3

1-letnie, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w Polsce w zależności od rodzaju leczenia

Radykalne	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	6460	70,9%	72,2%	71,6%	72,8%
2-letnie	4580	51,1%	53,1%	52,7%	53,5%
3-letnie	3304	40,7%	43,1%	42,9%	43,4%
Radykalne	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	3704	78,5%	79,3%	77,9%	80,7%
2-letnie	2907	62,4%	63,8%	62,1%	65,4%
3-letnie	2311	53,1%	55,0%	53,2%	56,7%
Radykalne	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	10164	73,7%	74,8%	73,9%	75,7%
2-letnie	7487	55,2%	57,0%	56,0%	58,1%
3-letnie	5615	45,2%	47,5%	46,4%	48,6%

Paliatywne	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	12735	27,8%	28,3%	27,5%	29,2%
2-letnie	3541	10,0%	10,4%	9,8%	11,0%
3-letnie	1273	5,4%	5,8%	5,3%	6,2%
Paliatywne	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	6558	33%	33%	32%	35%
2-letnie	2167	14%	14%	13%	15%
3-letnie	908	8%	8%	8%	9%
Paliatywne	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	19293	29,6%	30,1%	29,4%	30,8%
2-letnie	5708	11,3%	11,7%	11,2%	12,2%
3-letnie	2181	6,3%	6,6%	6,2%	7,0%

Objawowe	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	7484	14,3%	14,6%	13,8%	15,5%
2-letnie	1072	6,2%	6,5%	5,9%	7,1%
3-letnie	464	3,9%	4,2%	3,7%	4,7%
Objawowe	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	3492	17,8%	18,1%	16,8%	19,4%
2-letnie	620	9,6%	9,9%	8,9%	10,9%
3-letnie	334	6,6%	7,0%	6,1%	7,9%
Objawowe	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	10976	15,4%	15,7%	15,0%	16,4%
2-letnie	1692	7,3%	7,6%	7,1%	8,1%
3-letnie	798	4,8%	5,1%	4,6%	5,5%

Skierowany na leczenie	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	12709	42,2%	43,1%	42,2%	44,0%
2-letnie	5368	25,7%	26,8%	26,0%	27,6%
3-letnie	3270	19,8%	21,1%	20,3%	21,8%
Skierowany na leczenie	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	6748	50,0%	50,7%	49,5%	51,9%
2-letnie	3377	34,4%	35,3%	34,1%	36,5%
3-letnie	2317	27,6%	28,8%	27,6%	30,0%
Skierowany na leczenie	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	19457	44,9%	45,7%	45,0%	46,4%
2-letnie	8745	28,7%	29,7%	29,1%	30,4%
3-letnie	5587	22,5%	23,8%	23,1%	24,4%

Brak danych	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	4549	39,2%	39,9%	38,4%	41,4%
2-letnie	1781	22,9%	23,8%	22,5%	25,1%
3-letnie	1042	17,8%	18,9%	17,6%	20,1%
Brak danych	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	2247	48,2%	48,9%	46,7%	51,0%
2-letnie	1084	32,8%	33,6%	31,6%	35,6%
3-letnie	736	27,3%	28,5%	26,4%	30,5%

Brak danych	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	6796	42,2%	42,9%	41,7%	44,1%
2-letnie	2865	26,2%	27,1%	26,0%	28,2%
3-letnie	1778	20,9%	22,1%	21,0%	23,1%

Tabela 5.4

1-letnie, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w Polsce w zależności od typu leczenia

Skojarzone	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	2289	52,5%	53,4%	51,3%	55,5%
2-letnie	1201	29,8%	30,9%	28,9%	32,9%
3-letnie	682	20,5%	21,6%	19,8%	23,5%
Skojarzone	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	1175	58,5%	59,1%	56,2%	62,0%
2-letnie	687	36,9%	37,6%	34,8%	40,5%
3-letnie	433	27,8%	28,7%	25,9%	31,5%
Skojarzone	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	3464	54,5%	55,3%	53,6%	57,1%
2-letnie	1888	32,2%	33,2%	31,6%	34,8%
3-letnie	1115	22,9%	24,1%	22,5%	25,6%

Nieskojarzone	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	30552	39,4%	40,1%	39,6%	40,7%
2-letnie	12023	21,9%	22,8%	22,3%	23,3%
3-letnie	6685	15,8%	16,8%	16,3%	17,2%
Nieskojarzone	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	16201	46,4%	46,9%	46,2%	47,7%
2-letnie	7510	29,5%	30,3%	29,6%	31,1%
3-letnie	4787	22,8%	23,7%	23,0%	24,4%
Nieskojarzone	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	46753	41,8%	42,5%	42,0%	43,0%
2-letnie	19533	24,5%	25,4%	25,0%	25,8%
3-letnie	11472	18,2%	19,2%	18,8%	19,6%

Brak danych	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	11327	28,0%	28,6%	27,7%	29,4%
2-letnie	3168	17,8%	18,5%	17,8%	19,3%
3-letnie	2011	14,5%	15,5%	14,7%	16,2%
Brak danych	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	5493	36,3%	36,9%	35,6%	38,2%
2-letnie	1996	25,8%	26,6%	25,4%	27,8%
3-letnie	1414	21,6%	22,7%	21,5%	23,9%
Brak danych	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	16820	30,7%	31,3%	30,6%	32,0%
2-letnie	5164	20,4%	21,2%	20,5%	21,8%
3-letnie	3425	16,8%	17,8%	17,2%	18,5%

Tabele wskaźników przeżyć w Polsce w zależności od stadium zaawansowania, rodzaju leczenia, typu leczenia **według województw**

Tabela 5.5

1-roczone, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w **województwie dolnośląskim**

	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	3470	34,5%	35,2%	33,6%	36,9%
2-letnie	1198	19,2%	20,0%	18,6%	21,3%
3-letnie	665	14,6%	15,5%	14,2%	16,8%
	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	2084	42,6%	43,2%	41,0%	45,4%
2-letnie	888	27,2%	28,0%	26,0%	30,0%
3-letnie	566	22,2%	23,2%	21,3%	25,1%
	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	5554	37,6%	38,2%	36,9%	39,6%
2-letnie	2086	22,2%	23,0%	21,8%	24,1%
3-letnie	1231	17,4%	18,4%	17,3%	19,5%

Tabela 5.6

1-letnie, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w województwie
dolnośląskim w zależności od stadium zaawansowania

Stadium miejscowe	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	497	71,0%	72,4%	68,3%	76,6%
2-letnie	353	54,7%	57,0%	52,3%	61,6%
3-letnie	272	47,6%	50,6%	45,7%	55,5%
Stadium miejscowe	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	382	80,4%	81,4%	77,3%	85,6%
2-letnie	307	71,7%	73,7%	69,0%	78,5%
3-letnie	274	65,9%	68,8%	63,6%	74,0%
Stadium miejscowe	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	879	75%	76%	73%	79%
2-letnie	660	62%	64%	61%	68%
3-letnie	546	56%	59%	55%	62%

Stadium regionalne	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	850	45,8%	46,7%	43,2%	50,2%
2-letnie	389	23,1%	24,0%	21,0%	27,0%
3-letnie	196	15,5%	16,5%	13,8%	19,2%
Stadium regionalne	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	486	50,8%	51,5%	46,9%	56,1%
2-letnie	247	27,8%	28,5%	24,4%	32,7%
3-letnie	135	20,8%	21,7%	17,7%	25,6%
Stadium regionalne	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	1336	47,6%	48,4%	45,7%	51,2%
2-letnie	636	24,8%	25,7%	23,2%	28,1%
3-letnie	331	17,4%	18,4%	16,1%	20,6%

Stadium uogólnione	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	1457	20,9%	21,3%	19,1%	23,4%
2-letnie	304	7,9%	8,2%	6,7%	9,7%
3-letnie	115	5,0%	5,3%	4,1%	6,5%

Stadium uogólnione	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	827	25,9%	26,2%	23,2%	29,3%
2-letnie	214	10,0%	10,3%	8,2%	12,5%
3-letnie	83	5,9%	6,1%	4,4%	7,9%
Stadium uogólnione	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	2284	22,7%	23,1%	21,3%	24,9%
2-letnie	518	8,7%	9,0%	7,8%	10,2%
3-letnie	198	5,3%	5,6%	4,6%	6,6%

Brak danych	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	666	22,8%	23,3%	20,0%	26,6%
2-letnie	152	12,3%	12,8%	10,2%	15,5%
3-letnie	82	9,9%	10,5%	8,0%	13,0%
Brak danych	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	389	30,8%	31,4%	26,6%	36,1%
2-letnie	120	19,0%	19,7%	15,6%	23,8%
3-letnie	74	16,0%	16,9%	12,9%	20,8%
Brak danych	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	1055	25,8%	26,3%	23,5%	29,0%
2-letnie	272	14,8%	15,4%	13,1%	17,7%
3-letnie	156	12,1%	12,9%	10,7%	15,0%

Tabela 5.7

1-roczone, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w województwie dolnośląskim w zależności od rodzaju leczenia

Radykalne	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	681	68,9%	70,2%	68,0%	72,3%
2-letnie	469	49,8%	51,7%	50,3%	53,2%
3-letnie	339	40,8%	43,2%	42,0%	44,5%
Radykalne	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	450	76,4%	77,3%	73,3%	81,4%
2-letnie	344	61,6%	63,0%	58,3%	67,7%
3-letnie	277	56,2%	58,3%	53,3%	63,3%

Radykalne	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	1131	71,9%	73,0%	70,3%	75,7%
2-letnie	813	54,5%	56,3%	53,2%	59,3%
3-letnie	616	46,9%	49,3%	46,1%	52,5%

Paliatywne	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	1368	25,6%	26,1%	23,7%	28,5%
2-letnie	350	10,4%	10,8%	9,1%	12,5%
3-letnie	142	6,7%	7,1%	5,6%	8,6%
Paliatywne	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	808	32%	33%	29%	36%
2-letnie	259	14%	15%	12%	17%
3-letnie	116	9%	10%	7%	12%
Paliatywne	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	2176	28,0%	28,5%	26,5%	30,4%
2-letnie	609	11,9%	12,3%	10,9%	13,7%
3-letnie	258	7,7%	8,1%	6,8%	9,3%

Objawowe	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	686	16,3%	16,7%	13,8%	19,6%
2-letnie	112	8,0%	8,4%	6,2%	10,5%
3-letnie	55	6,0%	6,4%	4,4%	8,4%
Objawowe	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	369	20,1%	20,4%	16,2%	24,7%
2-letnie	74	12,5%	12,9%	9,4%	16,5%
3-letnie	46	9,4%	9,9%	6,6%	13,3%
Objawowe	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	1055	17,6%	18,0%	15,6%	20,4%
2-letnie	186	9,6%	10,0%	8,1%	11,9%
3-letnie	101	7,2%	7,7%	5,9%	9,4%

Skierowany na leczenie	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	588	37,8%	38,5%	34,4%	42,6%
2-letnie	222	18,2%	18,9%	15,6%	22,2%
3-letnie	107	13,6%	14,4%	11,4%	17,4%

Skierowany na leczenie	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	364	46,4%	47,1%	41,8%	52,4%
2-letnie	169	26,6%	27,4%	22,6%	32,2%
3-letnie	97	21,0%	22,0%	17,5%	26,4%
Skierowany na leczenie	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	952	41,1%	41,8%	38,5%	45,0%
2-letnie	391	21,4%	22,2%	19,4%	25,0%
3-letnie	204	16,4%	17,3%	14,8%	19,9%

Brak danych	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	127	32,3%	32,9%	24,5%	41,4%
2-letnie	41	17,3%	18,0%	11,1%	25,0%
3-letnie	22	12,6%	13,4%	7,1%	19,7%
Brak danych	Kobiety*				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	83	-	-	-	-
2-letnie	39	-	-	-	-
3-letnie	27	-	-	-	-
Brak danych	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	210	38,1%	38,7%	31,9%	45,6%
2-letnie	80	23,3%	24,2%	18,1%	30,2%
3-letnie	49	18,1%	19,1%	13,5%	24,7%

*Mała liczba przypadków - niska wiarygodność wyników

Tabela 5.8

1-letnie, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w województwie dolnośląskim w zależności od typu leczenia

Skojarzone	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	259	49,0%	49,9%	43,6%	56,3%
2-letnie	127	32,4%	33,7%	27,6%	39,7%
3-letnie	84	24,8%	26,3%	20,4%	32,2%
Skojarzone	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	161	58,4%	59,1%	51,2%	66,9%
2-letnie	94	40,4%	41,4%	33,4%	49,3%
3-letnie	65	34,8%	36,2%	28,1%	44,2%

Skojarzone	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	420	52,6%	53,5%	48,5%	58,4%
2-letnie	221	35,5%	36,6%	31,8%	41,5%
3-letnie	149	28,6%	30,1%	25,3%	34,9%

Nieskojarzone	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	2848	34,2%	34,9%	33,0%	36,7%
2-letnie	973	18,3%	19,1%	17,6%	20,6%
3-letnie	522	13,8%	14,7%	13,3%	16,1%
Nieskojarzone	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	1692	41,7%	42,3%	39,8%	44,7%
2-letnie	705	25,8%	26,5%	24,3%	28,7%
3-letnie	436	20,7%	21,7%	19,6%	23,8%
Nieskojarzone	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	4540	37,0%	37,6%	36,2%	39,1%
2-letnie	1678	21,1%	21,9%	20,6%	23,1%
3-letnie	958	16,4%	17,3%	16,1%	18,5%

Brak danych	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	363	27,0%	27,6%	22,8%	32,3%
2-letnie	98	16,3%	16,9%	12,9%	21,0%
3-letnie	59	13,3%	14,1%	10,3%	17,9%
Brak danych	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	231	38,5%	39,1%	32,6%	45,6%
2-letnie	89	28,1%	29,0%	22,9%	35,1%
3-letnie	65	24,0%	25,2%	19,3%	31,1%
Brak danych	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	594	31,5%	32,1%	28,2%	35,9%
2-letnie	187	20,9%	21,7%	18,2%	25,1%
3-letnie	124	17,5%	18,5%	15,2%	21,8%

Tabela 5.9

1-letnie, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w województwie kujawsko-pomorskim

	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	3037	37,9%	38,7%	36,9%	40,5%
2-letnie	1152	21,3%	22,1%	20,6%	23,7%
3-letnie	646	15,7%	16,7%	15,2%	18,1%
	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	1818	43,2%	43,8%	41,4%	46,1%
2-letnie	785	28,1%	28,8%	26,7%	31,0%
3-letnie	510	22,3%	23,3%	21,2%	25,4%
	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	4855	39,9%	40,6%	39,2%	42,0%
2-letnie	1937	23,8%	24,7%	23,4%	25,9%
3-letnie	1156	18,1%	19,2%	18,0%	20,4%

Tabela 5.10

1-letnie, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w województwie kujawsko-pomorskim w zależności od stadium zaawansowania

Stadium miejscowe	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	416	70,2%	71,6%	67,1%	76,2%
2-letnie	292	55,0%	57,4%	52,3%	62,4%
3-letnie	229	47,1%	50,2%	44,8%	55,5%
Stadium miejscowe	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	281	81,9%	82,9%	78,3%	87,6%
2-letnie	230	69,4%	71,3%	65,7%	77,0%
3-letnie	195	62,9%	65,6%	59,4%	71,7%
Stadium miejscowe	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	697	75%	76%	73%	80%
2-letnie	522	61%	63%	59%	67%
3-letnie	424	53%	56%	52%	61%

Stadium regionalne	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	839	46,0%	46,9%	43,4%	50,4%
2-letnie	386	24,9%	25,9%	22,8%	29,0%
3-letnie	209	16,8%	17,9%	15,0%	20,7%

Stadium regionalne	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	446	48,9%	49,5%	44,7%	54,3%
2-letnie	218	26,5%	27,1%	22,9%	31,4%
3-letnie	118	17,6%	18,4%	14,4%	22,3%
Stadium regionalne	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	1285	47,0%	47,8%	45,0%	50,7%
2-letnie	604	25,4%	26,4%	23,8%	28,9%
3-letnie	327	17,1%	18,0%	15,7%	20,3%

Stadium uogólnione	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	1271	22,5%	22,9%	20,6%	25,3%
2-letnie	286	7,8%	8,1%	6,5%	9,7%
3-letnie	99	3,9%	4,2%	3,0%	5,3%
Stadium uogólnione	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	764	26,3%	26,7%	23,4%	29,9%
2-letnie	201	10,9%	11,2%	8,9%	13,5%
3-letnie	83	7,3%	7,6%	5,6%	9,6%
Stadium uogólnione	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	2035	23,9%	24,3%	22,4%	26,3%
2-letnie	487	8,9%	9,3%	8,0%	10,6%
3-letnie	182	5,2%	5,5%	4,4%	6,5%

Brak danych	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	511	36,8%	37,5%	33,2%	41,9%
2-letnie	188	21,3%	22,2%	18,4%	26,0%
3-letnie	109	17,7%	18,9%	15,2%	22,5%
Brak danych	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	327	41,6%	42,2%	36,7%	47,8%
2-letnie	136	34,9%	36,0%	30,5%	41,4%
3-letnie	114	28,9%	30,3%	24,9%	35,7%
Brak danych	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	838	38,7%	39,4%	36,0%	42,8%
2-letnie	324	26,6%	27,6%	24,5%	30,8%
3-letnie	223	22,1%	23,4%	20,3%	26,5%

Tabela 5.11

1-letnie, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w województwie kujawsko-pomorskim w zależności od rodzaju leczenia

Radykalne	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	295	79,0%	80,5%	78,1%	82,9%
2-letnie	233	62,0%	64,4%	62,9%	66,0%
3-letnie	183	51,0%	54,0%	52,8%	55,2%
Radykalne	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	199	80,9%	81,7%	76,1%	87,4%
2-letnie	161	69,8%	71,4%	64,7%	78,0%
3-letnie	139	63,5%	65,6%	58,4%	72,8%
Radykalne	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	494	79,8%	81,0%	77,3%	84,7%
2-letnie	394	65,2%	67,2%	62,8%	71,7%
3-letnie	322	56,0%	58,7%	53,9%	63,5%

Paliatywne	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	1122	30,7%	31,3%	28,5%	34,1%
2-letnie	344	11,4%	11,9%	9,9%	13,8%
3-letnie	128	7,5%	8,0%	6,3%	9,6%
Paliatywne	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	684	35%	35%	32%	39%
2-letnie	239	16%	16%	13%	19%
3-letnie	109	10%	11%	8%	13%
Paliatywne	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	1806	32,3%	32,8%	30,6%	35,1%
2-letnie	583	13,1%	13,6%	11,9%	15,2%
3-letnie	237	8,6%	9,1%	7,7%	10,5%

Objawowe	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	348	13,5%	13,8%	10,1%	17,5%
2-letnie	47	4,9%	5,1%	2,7%	7,5%
3-letnie	17	3,3%	3,5%	1,4%	5,6%

Objawowe	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	182	15,9%	16,2%	10,7%	21,8%
2-letnie	29	8,2%	8,6%	4,3%	12,8%
3-letnie	15	3,4%	3,6%	0,6%	6,5%
Objawowe	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	530	14,3%	14,6%	11,5%	17,7%
2-letnie	76	6,0%	6,3%	4,1%	8,5%
3-letnie	32	3,3%	3,5%	1,8%	5,2%

Skierowany na leczenie	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	1255	41,6%	42,4%	39,6%	45,3%
2-letnie	522	25,0%	26,0%	23,5%	28,6%
3-letnie	314	18,1%	19,3%	16,9%	21,7%
Skierowany na leczenie	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	736	47,0%	47,7%	43,9%	51,4%
2-letnie	346	32,5%	33,4%	29,9%	37,0%
3-letnie	239	26,8%	28,0%	24,5%	31,5%
Skierowany na leczenie	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	1991	43,6%	44,4%	42,1%	46,6%
2-letnie	868	27,8%	28,8%	26,7%	30,9%
3-letnie	553	21,3%	22,5%	20,5%	24,5%

Tabela 5.12

1-roczone, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w województwie kujawsko-pomorskim w zależności od typu leczenia

Skojarzone	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	259	50,6%	51,5%	45,2%	57,9%
2-letnie	131	31,3%	32,5%	26,5%	38,5%
3-letnie	81	26,1%	27,6%	21,7%	33,5%
Skojarzone	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	165	52,1%	52,8%	44,9%	60,6%
2-letnie	86	34,5%	35,4%	27,8%	43,0%
3-letnie	57	30,3%	31,5%	24,0%	39,1%

Skojarzone	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	424	51,2%	52,0%	47,1%	56,9%
2-letnie	217	32,5%	33,6%	28,9%	38,3%
3-letnie	138	27,7%	29,1%	24,5%	33,8%

Nieskojarzone	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	2762	36,9%	37,7%	35,8%	39,5%
2-letnie	1020	20,4%	21,3%	19,7%	22,9%
3-letnie	564	14,8%	15,7%	14,2%	17,2%
Nieskojarzone	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	1644	42,1%	42,7%	40,2%	45,1%
2-letnie	692	27,3%	28,0%	25,8%	30,3%
3-letnie	448	21,3%	22,2%	20,1%	24,4%
Nieskojarzone	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	4406	38,9%	39,5%	38,0%	41,0%
2-letnie	1712	23,0%	23,8%	22,5%	25,1%
3-letnie	1012	17,2%	18,2%	16,9%	19,4%

Tabela 5.13

1-roczone, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w województwie lubelskim

	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	2380	37,1%	37,8%	35,8%	39,8%
2-letnie	882	20,6%	21,5%	19,7%	23,2%
3-letnie	491	15,0%	15,9%	14,3%	17,5%
	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	940	46,0%	46,5%	43,2%	49,8%
2-letnie	432	28,9%	29,6%	26,6%	32,7%
3-letnie	272	23,1%	23,9%	21,0%	26,9%
	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	3320	39,6%	40,3%	38,5%	42,0%
2-letnie	1314	23,0%	23,8%	22,3%	25,3%
3-letnie	763	17,2%	18,2%	16,8%	19,6%

Tabela 5.14

1-letnie, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w województwie lubelskim w zależności od stadium zaawansowania

Stadium miejscowe	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	155	71,0%	72,4%	64,9%	79,8%
2-letnie	110	56,1%	58,4%	50,1%	66,7%
3-letnie	87	47,1%	50,1%	41,4%	58,8%
Stadium miejscowe	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	63	76,2%	77,1%	66,2%	88,0%
2-letnie	48	60,3%	61,8%	49,2%	74,4%
3-letnie	38	56,7%	58,9%	45,8%	72,0%
Stadium miejscowe	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	218	72%	74%	68%	80%
2-letnie	158	57%	59%	52%	66%
3-letnie	125	50%	53%	45%	60%

Stadium regionalne	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	480	44,4%	45,2%	40,6%	49,9%
2-letnie	213	24,4%	25,4%	21,3%	29,4%
3-letnie	117	16,3%	17,3%	13,6%	21,0%
Stadium regionalne	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	192	50,0%	50,6%	43,3%	57,9%
2-letnie	96	24,5%	25,0%	18,7%	31,4%
3-letnie	47	17,0%	17,7%	11,8%	23,5%
Stadium regionalne	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	672	46,0%	46,8%	42,9%	50,7%
2-letnie	309	24,4%	25,3%	21,8%	28,7%
3-letnie	164	16,5%	17,4%	14,3%	20,5%

Stadium uogólnione	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	695	20,6%	21,0%	17,8%	24,1%
2-letnie	143	5,3%	5,5%	3,8%	7,3%
3-letnie	37	2,2%	2,4%	1,2%	3,5%

Stadium uogólnione	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	318	28,9%	29,3%	24,1%	34,4%
2-letnie	92	9,7%	10,0%	6,6%	13,4%
3-letnie	31	4,4%	4,5%	2,1%	7,0%
Stadium uogólnione	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	1013	23,2%	23,6%	20,9%	26,3%
2-letnie	235	6,7%	6,9%	5,3%	8,6%
3-letnie	68	2,9%	3,0%	1,9%	4,2%

Brak danych	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	1050	39,6%	40,4%	37,3%	43,5%
2-letnie	416	23,8%	24,8%	22,1%	27,5%
3-letnie	250	18,2%	19,4%	16,8%	22,0%
Brak danych	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	367	53,4%	54,0%	48,8%	59,3%
2-letnie	196	42,5%	43,5%	38,3%	48,8%
3-letnie	156	37,1%	38,5%	33,1%	43,9%
Brak danych	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	1417	43,2%	44,0%	41,3%	46,7%
2-letnie	612	28,7%	29,7%	27,2%	32,2%
3-letnie	406	23,0%	24,4%	21,9%	26,8%

Tabela 5.15

1-roczone, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w województwie lubelskim w zależności od rodzaju leczenia

Radykalne	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	430	68,4%	69,7%	66,5%	72,8%
2-letnie	294	43,3%	44,9%	43,1%	46,7%
3-letnie	186	31,2%	33,1%	31,9%	34,3%
Radykalne	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	169	72,8%	73,4%	66,5%	80,3%
2-letnie	123	49,7%	50,6%	42,8%	58,4%
3-letnie	84	40,9%	42,1%	34,0%	50,1%

Radykalne	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	599	69,6%	70,7%	66,9%	74,5%
2-letnie	417	45,1%	46,5%	42,3%	50,7%
3-letnie	270	33,9%	35,6%	31,4%	39,8%

Paliatywne	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	483	23,0%	23,4%	19,5%	27,3%
2-letnie	111	7,9%	8,2%	5,6%	10,7%
3-letnie	38	3,6%	3,8%	2,0%	5,6%
Paliatywne	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	215	33%	33%	27%	40%
2-letnie	71	11%	11%	7%	16%
3-letnie	24	4%	4%	1%	7%
Paliatywne	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	698	26,1%	26,5%	23,1%	29,9%
2-letnie	182	8,9%	9,2%	7,0%	11,4%
3-letnie	62	3,7%	3,9%	2,3%	5,4%

Objawowe	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	338	21,6%	22,1%	17,5%	26,6%
2-letnie	73	9,2%	9,6%	6,3%	12,8%
3-letnie	31	5,4%	5,8%	3,1%	8,5%
Objawowe	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	116	23,3%	23,6%	15,7%	31,6%
2-letnie	27	12,1%	12,4%	6,2%	18,7%
3-letnie	14	10,1%	10,5%	4,6%	16,5%
Objawowe	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	454	22,0%	22,5%	18,5%	26,4%
2-letnie	100	9,9%	10,3%	7,4%	13,2%
3-letnie	45	6,6%	7,0%	4,5%	9,6%

Skierowany na leczenie	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	311	33,8%	34,5%	29,0%	40,0%
2-letnie	105	20,9%	21,8%	17,0%	26,6%
3-letnie	65	16,6%	17,7%	13,2%	22,3%

Skierowany na leczenie	Kobiety*				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	100	-	-	-	-
2-letnie	42	-	-	-	-
3-letnie	32	-	-	-	-
Skierowany na leczenie	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	411	35,8%	36,5%	31,6%	41,3%
2-letnie	147	23,6%	24,5%	20,2%	28,9%
3-letnie	97	19,8%	21,0%	16,7%	25,2%

*Mała liczba przypadków, niska wiarygodność wyników

Brak danych	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	802	37,2%	37,9%	34,4%	41,4%
2-letnie	298	21,3%	22,2%	19,2%	25,2%
3-letnie	171	17,0%	18,0%	15,1%	20,9%
Brak danych	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	337	49,9%	50,4%	44,9%	55,9%
2-letnie	168	34,7%	35,5%	30,2%	40,9%
3-letnie	117	29,0%	30,0%	24,8%	35,3%
Brak danych	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	1139	40,9%	41,6%	38,7%	44,6%
2-letnie	466	25,3%	26,2%	23,5%	28,9%
3-letnie	288	20,5%	21,6%	19,0%	24,2%

Tabela 5.16

1-letnie, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w województwie lubelskim w zależności od typu leczenia

Skojarzone	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	196	59,7%	60,7%	53,6%	67,9%
2-letnie	117	30,6%	31,7%	24,9%	38,5%
3-letnie	60	17,9%	18,9%	13,0%	24,8%
Skojarzone	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	70	-	-	-	-
2-letnie	47	-	-	-	-
3-letnie	21	-	-	-	-

*Mała liczba przypadków, niska wiarygodność wyników

Skojarzone	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	266	61,7%	62,6%	56,6%	68,7%
2-letnie	164	30,5%	31,4%	25,6%	37,2%
3-letnie	81	17,5%	18,3%	13,3%	23,3%

Nieskojarzone	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	1236	43,3%	44,1%	41,2%	47,0%
2-letnie	535	22,1%	23,0%	20,5%	25,4%
3-letnie	273	15,8%	16,7%	14,5%	19,0%
Nieskojarzone	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	531	51,8%	52,3%	47,9%	56,7%
2-letnie	275	32,0%	32,7%	28,6%	36,9%
3-letnie	170	24,8%	25,7%	21,7%	29,7%
Nieskojarzone	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	1767	45,8%	46,6%	44,2%	49,0%
2-letnie	810	25,1%	25,9%	23,8%	28,1%
3-letnie	443	18,5%	19,4%	17,4%	21,4%

Brak danych	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	948	24,3%	24,8%	21,9%	27,6%
2-letnie	230	16,7%	17,4%	14,9%	19,9%
3-letnie	158	13,4%	14,3%	11,9%	16,7%
Brak danych	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	339	32,4%	32,9%	27,7%	38,1%
2-letnie	110	23,9%	24,6%	19,8%	29,3%
3-letnie	81	21,8%	22,8%	18,1%	27,5%
Brak danych	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	1287	26,4%	26,9%	24,4%	29,4%
2-letnie	340	18,6%	19,3%	17,0%	21,6%
3-letnie	239	15,6%	16,5%	14,4%	18,7%

Tabela 5.17

1-letnie, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w województwie lubuskim

	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	1158	37,6%	38,3%	35,4%	41,2%
2-letnie	435	22,6%	23,5%	21,0%	26,1%
3-letnie	262	16,6%	17,7%	15,3%	20,0%
	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	597	39,9%	40,4%	36,3%	44,4%
2-letnie	238	27,5%	28,2%	24,5%	32,0%
3-letnie	164	21,3%	22,2%	18,7%	25,8%
	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	1755	38,3%	39,0%	36,7%	41,4%
2-letnie	673	24,3%	25,1%	23,0%	27,3%
3-letnie	426	18,2%	19,2%	17,2%	21,2%

Tabela 5.18

1-letnie, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w województwie lubuskim w zależności od stadium zaawansowania

Stadium miejscowe	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	265	58,5%	59,7%	53,5%	65,8%
2-letnie	155	46,8%	48,7%	42,3%	55,1%
3-letnie	124	35,4%	37,7%	31,2%	44,2%
Stadium miejscowe	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	141	63,1%	63,9%	55,7%	72,2%
2-letnie	89	49,6%	50,9%	42,3%	59,6%
3-letnie	70	44,1%	45,9%	36,9%	54,8%
Stadium miejscowe	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	406	60%	61%	56%	66%
2-letnie	244	48%	50%	44%	55%
3-letnie	194	38%	40%	35%	46%

Stadium regionalne	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	315	47,9%	48,9%	43,1%	54,6%
2-letnie	151	27,3%	28,4%	23,2%	33,6%
3-letnie	86	20,0%	21,2%	16,3%	26,1%
Stadium regionalne	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	190	49,5%	50,1%	42,7%	57,4%
2-letnie	94	35,8%	36,7%	29,6%	43,8%
3-letnie	68	27,0%	28,0%	21,2%	34,9%
Stadium regionalne	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	505	48,5%	49,3%	44,8%	53,8%
2-letnie	245	30,5%	31,5%	27,3%	35,8%
3-letnie	154	22,6%	23,8%	19,8%	27,8%

Stadium uogólnione	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	488	19,9%	20,3%	16,6%	23,9%
2-letnie	97	6,8%	7,0%	4,7%	9,4%
3-letnie	33	4,1%	4,3%	2,4%	6,3%
Stadium uogólnione	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	241	17,4%	17,7%	12,7%	22,6%
2-letnie	42	7,1%	7,3%	3,9%	10,7%
3-letnie	17	3,5%	3,7%	1,2%	6,2%
Stadium uogólnione	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	729	19,1%	19,4%	16,4%	22,4%
2-letnie	139	6,9%	7,1%	5,2%	9,0%
3-letnie	50	3,9%	4,1%	2,6%	5,7%

Tabela 5.19

1-letnie, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w województwie lubuskim w zależności od rodzaju leczenia

Radykalne	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	175	76,0%	77,4%	73,8%	81,1%
2-letnie	133	55,4%	57,6%	55,2%	60,0%
3-letnie	97	45,1%	47,8%	45,8%	49,7%
Radykalne	Kobiety*				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	98	79,6%	80,4%	72,2%	88,7%
2-letnie	78	-	-	-	-
3-letnie	64	-	-	-	-
Radykalne	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	273	77,3%	78,5%	73,4%	83,7%
2-letnie	211	59,0%	60,9%	54,8%	67,1%
3-letnie	161	50,7%	53,3%	46,7%	59,8%

*Mała liczba przypadków, niska wiarygodność wyników

Paliatywne	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	344	26,5%	27,0%	22,1%	31,8%
2-letnie	91	11,0%	11,5%	8,0%	15,0%
3-letnie	38	6,1%	6,5%	3,6%	9,3%
Paliatywne	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	200	29%	29%	23%	36%
2-letnie	58	17%	17%	12%	22%
3-letnie	33	9%	10%	5%	14%
Paliatywne	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	544	27,4%	27,9%	24,0%	31,7%
2-letnie	149	13,1%	13,5%	10,5%	16,5%
3-letnie	71	7,3%	7,7%	5,3%	10,2%

Objawowe	Mężczyźni*				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	131	10,7%	10,9%	5,4%	16,4%
2-letnie	14	-	-	-	-
3-letnie	5	-	-	-	-
Objawowe	Kobiety*				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	61	-	-	-	-

2-letnie	7	-	-	-	-
3-letnie	3	-	-	-	-
Objawowe	Obie płcie*				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	192	10,9%	11,2%	6,6%	15,8%
2-letnie	21	-	-	-	-
3-letnie	8	-	-	-	-

*Mała liczba przypadków, niska wiarygodność wyników

Skierowany na leczenie	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	467	38,3%	39,1%	34,5%	43,7%
2-letnie	179	24,4%	25,4%	21,3%	29,5%
3-letnie	114	18,2%	19,3%	15,4%	23,3%
Skierowany na leczenie	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	216	40,7%	41,3%	34,5%	48,0%
2-letnie	88	27,3%	28,0%	21,8%	34,3%
3-letnie	59	21,5%	22,4%	16,4%	28,3%
Skierowany na leczenie	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	683	39,1%	39,8%	36,0%	43,6%
2-letnie	267	25,3%	26,2%	22,8%	29,7%
3-letnie	173	19,3%	20,3%	17,1%	23,6%

Tabela 5.20

1-roczone, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w województwie lubuskim w zależności od typu leczenia

Skojarzone	Mężczyźni*				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	55	-	-	-	-
2-letnie	31	-	-	-	-
3-letnie	20	-	-	-	-
Skojarzone	Kobiety*				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	5	-	-	-	-
2-letnie	4	-	-	-	-
3-letnie	3	-	-	-	-
Skojarzone	Obie płcie*				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	60	-	-	-	-
2-letnie	35	-	-	-	-
3-letnie	23	-	-	-	-

*Mała liczba przypadków, niska wiarygodność wyników

Nieskojarzone	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	783	40,2%	41,0%	37,4%	44,6%
2-letnie	315	22,9%	23,8%	20,6%	26,9%
3-letnie	179	16,1%	17,0%	14,2%	19,9%
Nieskojarzone	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	410	41,7%	42,2%	37,3%	47,2%
2-letnie	171	28,8%	29,5%	25,0%	34,1%
3-letnie	118	21,7%	22,6%	18,2%	26,9%
Nieskojarzone	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	1193	40,7%	41,4%	38,5%	44,3%
2-letnie	486	24,9%	25,8%	23,2%	28,4%
3-letnie	297	18,0%	19,0%	16,6%	21,4%

Brak danych	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	320	27,8%	28,4%	23,3%	33,5%
2-letnie	89	19,7%	20,5%	15,9%	25,1%
3-letnie	63	17,2%	18,3%	13,7%	22,8%
Brak danych	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	182	34,6%	35,1%	27,9%	42,2%
2-letnie	63	23,6%	24,3%	17,8%	30,8%
3-letnie	43	19,6%	20,4%	14,2%	26,7%
Brak danych	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	502	30,3%	30,8%	26,7%	35,0%
2-letnie	152	21,1%	21,9%	18,1%	25,7%
3-letnie	106	18,0%	19,1%	15,4%	22,8%

Tabela 5.21

1-roczone, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w województwie łódzkim

	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	2865	38,2%	39,0%	37,1%	40,8%
2-letnie	1095	22,7%	23,6%	22,0%	25,3%
3-letnie	651	17,4%	18,5%	16,9%	20,0%

	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	1564	44,8%	45,4%	42,8%	47,9%
2-letnie	700	31,0%	31,9%	29,5%	34,3%
3-letnie	485	24,2%	25,2%	22,9%	27,6%
	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	4429	40,5%	41,2%	39,7%	42,7%
2-letnie	1795	25,6%	26,6%	25,2%	27,9%
3-letnie	1136	19,8%	20,9%	19,6%	22,2%

Tabela 5.22

1-letnie, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w województwie łódzkim w zależności od stadium zaawansowania

Stadium miejscowe	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	751	57,1%	58,3%	54,6%	62,0%
2-letnie	429	40,3%	42,0%	38,3%	45,7%
3-letnie	303	31,9%	34,0%	30,1%	37,8%
Stadium miejscowe	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	402	62,2%	63,0%	58,1%	67,9%
2-letnie	250	52,0%	53,4%	48,3%	58,5%
3-letnie	209	45,7%	47,7%	42,2%	53,1%
Stadium miejscowe	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	1153	59%	60%	57%	63%
2-letnie	679	44%	46%	43%	49%
3-letnie	512	37%	39%	36%	42%

Stadium regionalne	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	436	44,7%	45,6%	40,8%	50,5%
2-letnie	195	22,2%	23,2%	19,0%	27,3%
3-letnie	97	17,3%	18,4%	14,4%	22,4%
Stadium regionalne	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	210	51,9%	52,6%	45,6%	59,6%
2-letnie	109	29,0%	29,8%	23,4%	36,3%
3-letnie	61	20,9%	21,8%	15,7%	27,9%

Stadium regionalne	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	646	47,1%	47,9%	43,9%	51,9%
2-letnie	304	24,5%	25,3%	21,8%	28,8%
3-letnie	158	18,5%	19,5%	16,2%	22,9%

Stadium uogólnione	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	808	19,6%	19,9%	17,1%	22,8%
2-letnie	158	6,9%	7,2%	5,3%	9,1%
3-letnie	56	4,5%	4,8%	3,2%	6,4%
Stadium uogólnione	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	440	25,9%	26,3%	22,0%	30,5%
2-letnie	114	12,7%	13,1%	9,8%	16,4%
3-letnie	56	6,8%	7,1%	4,4%	9,7%
Stadium uogólnione	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	1248	21,8%	22,2%	19,8%	24,6%
2-letnie	272	9,0%	9,3%	7,6%	11,0%
3-letnie	112	5,3%	5,6%	4,2%	7,0%

Brak danych	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	870	36,0%	36,7%	33,4%	40,0%
2-letnie	313	22,4%	23,3%	20,4%	26,3%
3-letnie	195	17,0%	18,0%	15,3%	20,8%
Brak danych	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	512	44,3%	44,9%	40,5%	49,4%
2-letnie	227	31,1%	31,9%	27,7%	36,1%
3-letnie	159	24,2%	25,3%	21,3%	29,3%
Brak danych	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	1382	39,1%	39,8%	37,1%	42,4%
2-letnie	540	25,6%	26,5%	24,1%	29,0%
3-letnie	354	19,7%	20,8%	18,5%	23,0%

Tabela 5.24

1-letnie, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w województwie łódzkim w zależności od rodzaju leczenia

Radykalne	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	661	55,2%	56,3%	53,5%	59,2%
2-letnie	365	36,8%	38,3%	36,4%	40,1%
3-letnie	243	29,2%	31,0%	29,4%	32,6%
Radykalne	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	367	61,6%	62,3%	57,2%	67,5%
2-letnie	226	48,0%	49,2%	43,8%	54,5%
3-letnie	176	36,1%	37,5%	31,9%	43,1%
Radykalne	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	1028	57,5%	58,5%	55,3%	61,6%
2-letnie	591	40,8%	42,2%	39,0%	45,4%
3-letnie	419	31,7%	33,4%	30,1%	36,6%

Paliatywne	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	495	20,6%	21,0%	17,3%	24,7%
2-letnie	102	5,7%	5,9%	3,7%	8,0%
3-letnie	28	3,6%	3,8%	2,0%	5,6%
Paliatywne	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	256	23%	24%	18%	29%
2-letnie	60	10%	10%	6%	14%
3-letnie	25	6%	6%	3%	10%
Paliatywne	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	751	21,6%	22,0%	18,9%	25,0%
2-letnie	162	7,1%	7,3%	5,4%	9,3%
3-letnie	53	4,4%	4,7%	3,0%	6,3%

Objawowe	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	473	16,9%	17,3%	13,7%	20,8%
2-letnie	80	10,6%	11,0%	8,1%	14,0%
3-letnie	50	7,5%	8,0%	5,3%	10,6%

Objawowe	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	258	28,3%	28,7%	23,0%	34,4%
2-letnie	73	19,8%	20,4%	15,3%	25,5%
3-letnie	51	16,9%	17,8%	12,8%	22,8%
Objawowe	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	731	20,9%	21,3%	18,3%	24,4%
2-letnie	153	13,8%	14,4%	11,7%	17,0%
3-letnie	101	10,8%	11,4%	8,9%	13,9%

Skierowany na leczenie	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	848	47,3%	48,2%	44,7%	51,7%
2-letnie	401	30,4%	31,6%	28,4%	34,9%
3-letnie	258	22,9%	24,3%	21,1%	27,4%
Skierowany na leczenie	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	464	53,0%	53,7%	49,0%	58,4%
2-letnie	246	37,3%	38,3%	33,7%	42,9%
3-letnie	173	28,9%	30,1%	25,6%	34,7%
Skierowany na leczenie	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	1312	49,3%	50,2%	47,3%	53,0%
2-letnie	647	32,9%	34,0%	31,3%	36,7%
3-letnie	431	25,0%	26,4%	23,8%	29,0%

Brak danych	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	381	38,3%	39,1%	34,0%	44,2%
2-letnie	146	18,6%	19,4%	15,3%	23,6%
3-letnie	71	15,2%	16,1%	12,2%	20,1%
Brak danych	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	214	43,5%	44,0%	37,2%	50,9%
2-letnie	93	28,0%	28,8%	22,5%	35,1%
3-letnie	60	23,7%	24,7%	18,7%	30,8%
Brak danych	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	595	40,2%	40,9%	36,8%	45,0%
2-letnie	239	22,0%	22,8%	19,3%	26,3%
3-letnie	131	18,2%	19,3%	15,9%	22,6%

Tabela 5.24

1-letnie, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w województwie łódzkim w zależności od typu leczenia

Skojarzone	Mężczyźni*				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	108	-	-	-	-
2-letnie	39	-	-	-	-
3-letnie	22	-	-	-	-
Skojarzone	Kobiety*				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	61	-	-	-	-
2-letnie	34	-	-	-	-
3-letnie	21	-	-	-	-
Skojarzone	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	169	43,2%	43,9%	36,1%	51,6%
2-letnie	73	25,4%	26,3%	19,4%	33,2%
3-letnie	43	15,4%	16,2%	10,2%	22,2%

*Mała liczba przypadków, niska wiarygodność wyników

Nieskojarzone	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	2298	41,3%	42,2%	40,1%	44,3%
2-letnie	950	24,5%	25,5%	23,7%	27,4%
3-letnie	564	18,7%	19,9%	18,1%	21,7%
Nieskojarzone	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	1250	46,6%	47,2%	44,3%	50,0%
2-letnie	582	32,3%	33,2%	30,5%	35,9%
3-letnie	404	25,6%	26,7%	24,0%	29,4%
Nieskojarzone	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	3548	43,2%	43,9%	42,2%	45,6%
2-letnie	1532	27,3%	28,3%	26,7%	29,8%
3-letnie	968	21,2%	22,3%	20,8%	23,8%

Brak danych	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	459	23,1%	23,6%	19,6%	27,6%
2-letnie	106	14,2%	14,8%	11,4%	18,2%
3-letnie	65	11,5%	12,3%	9,1%	15,4%

Brak danych	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	253	33,2%	33,7%	27,7%	39,8%
2-letnie	84	23,7%	24,5%	19,0%	30,1%
3-letnie	60	18,5%	19,5%	14,4%	24,7%
Brak danych	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	712	26,7%	27,2%	23,8%	30,6%
2-letnie	190	17,6%	18,2%	15,3%	21,2%
3-letnie	125	14,0%	14,9%	12,1%	17,6%

Tabela 5.25

1-roczone, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w województwie małopolskim

	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	3426	34,4%	34,9%	33,2%	36,5%
2-letnie	1177	19,4%	19,9%	18,5%	21,3%
3-letnie	663	14,6%	15,2%	14,0%	16,5%
	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	1439	41,2%	41,8%	39,1%	44,4%
2-letnie	593	26,5%	27,2%	24,8%	29,6%
3-letnie	381	20,3%	21,2%	18,9%	23,5%
	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	4865	36,4%	36,9%	35,5%	38,3%
2-letnie	1770	21,5%	22,1%	20,8%	23,3%
3-letnie	1044	16,3%	17,0%	15,9%	18,1%

Tabela 5.26

1-roczone, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w województwie małopolskim w zależności od stadium zaawansowania

Stadium miejscowe	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	561	73,4%	74,5%	70,7%	78,3%
2-letnie	412	54,5%	56,0%	51,7%	60,4%
3-letnie	306	47,5%	49,4%	44,9%	53,9%
Stadium miejscowe	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	247	79,4%	80,3%	75,1%	85,5%
2-letnie	196	66,8%	68,4%	62,3%	74,6%
3-letnie	165	56,1%	58,2%	51,4%	65,0%

Stadium miejscowe	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	808	75%	76%	73%	79%
2-letnie	608	58%	60%	56%	63%
3-letnie	471	50%	52%	48%	56%

Stadium uogólnione	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	1443	16,3%	16,5%	14,5%	18,5%
2-letnie	235	5,6%	5,8%	4,5%	7,0%
3-letnie	81	2,9%	3,0%	2,1%	3,9%
Stadium uogólnione	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	594	19,5%	19,8%	16,5%	23,1%
2-letnie	116	7,4%	7,6%	5,4%	9,8%
3-letnie	44	4,1%	4,3%	2,5%	6,0%
Stadium uogólnione	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	2037	17,2%	17,5%	15,8%	19,2%
2-letnie	351	6,1%	6,3%	5,2%	7,4%
3-letnie	125	3,2%	3,4%	2,5%	4,2%

Brak danych	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	617	33,7%	34,2%	30,4%	38,1%
2-letnie	208	19,9%	20,5%	17,2%	23,8%
3-letnie	123	15,4%	16,1%	13,0%	19,2%
Brak danych	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	255	39,2%	39,9%	33,7%	46,1%
2-letnie	100	29,4%	30,4%	24,5%	36,4%
3-letnie	75	24,5%	25,8%	20,0%	31,6%
Brak danych	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	872	35,3%	35,9%	32,6%	39,2%
2-letnie	308	22,7%	23,4%	20,5%	26,3%
3-letnie	198	18,1%	18,9%	16,1%	21,7%

Tabela 5.27

1-letnie, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w województwie małopolskim w zależności od rodzaju leczenia

Radykalne	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	241	73,0%	74,0%	72,0%	76,0%
2-letnie	176	53,5%	54,8%	53,6%	56,1%
3-letnie	129	44,9%	46,5%	45,5%	47,4%
Radykalne	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	122	77,0%	77,8%	70,1%	85,4%
2-letnie	94	62,3%	63,5%	54,5%	72,4%
3-letnie	76	47,4%	48,8%	39,2%	58,4%
Radykalne	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	363	74,4%	75,3%	70,6%	79,9%
2-letnie	270	56,5%	57,7%	52,4%	63,1%
3-letnie	205	45,8%	47,3%	41,8%	52,8%

Paliatywne	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	745	28,6%	29,0%	25,6%	32,4%
2-letnie	213	9,7%	9,9%	7,7%	12,1%
3-letnie	72	5,6%	5,8%	4,0%	7,6%
Paliatywne	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	297	32%	33%	27%	38%
2-letnie	96	14%	15%	10%	19%
3-letnie	42	9%	9%	6%	13%
Paliatywne	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	1042	29,7%	30,1%	27,2%	32,9%
2-letnie	309	10,9%	11,2%	9,2%	13,2%
3-letnie	114	6,5%	6,7%	5,1%	8,4%

Objawowe	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	652	8,6%	8,7%	6,5%	11,0%
2-letnie	56	3,8%	4,0%	2,4%	5,5%
3-letnie	25	2,0%	2,1%	1,0%	3,3%

Objawowe	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	237	7,2%	7,3%	3,9%	10,8%
2-letnie	17	3,0%	3,1%	0,8%	5,4%
3-letnie	7	2,1%	2,3%	0,3%	4,2%
Objawowe	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	889	8,2%	8,4%	6,5%	10,2%
2-letnie	73	3,6%	3,7%	2,4%	5,0%
3-letnie	32	2,1%	2,2%	1,2%	3,2%

Skierowany na leczenie	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	1001	41,4%	41,9%	38,8%	45,1%
2-letnie	414	23,0%	23,6%	20,9%	26,3%
3-letnie	230	18,2%	18,9%	16,3%	21,5%
Skierowany na leczenie	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	443	50,3%	50,9%	46,1%	55,8%
2-letnie	223	33,6%	34,5%	29,9%	39,1%
3-letnie	149	27,2%	28,3%	23,7%	32,8%
Skierowany na leczenie	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	1444	44,1%	44,7%	42,1%	47,4%
2-letnie	637	26,2%	26,9%	24,6%	29,3%
3-letnie	379	20,9%	21,8%	19,5%	24,1%

Brak danych	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	763	41,4%	41,9%	38,3%	45,6%
2-letnie	316	26,9%	27,5%	24,2%	30,8%
3-letnie	205	20,5%	21,2%	18,1%	24,4%
Brak danych	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	330	48,5%	49,1%	43,5%	54,6%
2-letnie	160	31,8%	32,6%	27,4%	37,9%
3-letnie	105	25,1%	26,1%	20,9%	31,3%
Brak danych	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	1093	43,6%	44,1%	41,1%	47,1%
2-letnie	476	28,4%	29,1%	26,3%	31,9%
3-letnie	310	21,9%	22,7%	20,0%	25,4%

Tabela 5.28

1-letnie, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w województwie małopolskim w zależności od typu leczenia

Skojarzone	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	148	55,4%	56,1%	47,8%	64,4%
2-letnie	82	29,7%	30,4%	22,7%	38,1%
3-letnie	44	16,3%	16,8%	10,2%	23,3%
Skojarzone	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	79	-	-	-	-
2-letnie	41	-	-	-	-
3-letnie	24	-	-	-	-
Skojarzone	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	227	54,2%	54,8%	48,1%	61,5%
2-letnie	123	30,0%	30,6%	24,4%	36,8%
3-letnie	68	16,2%	16,7%	11,5%	21,9%

*Mała liczba przypadków, niska wiarygodność wyników

Nieskojarzone	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	1708	39,9%	40,5%	38,1%	42,9%
2-letnie	682	20,8%	21,3%	19,3%	23,3%
3-letnie	355	15,0%	15,6%	13,8%	17,4%
Nieskojarzone	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	679	47,1%	47,7%	43,8%	51,5%
2-letnie	320	29,5%	30,2%	26,6%	33,7%
3-letnie	200	21,6%	22,4%	19,1%	25,8%
Nieskojarzone	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	2387	42,0%	42,5%	40,5%	44,6%
2-letnie	1002	23,3%	23,8%	22,1%	25,6%
3-letnie	555	16,9%	17,5%	15,9%	19,2%

Brak danych	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	1570	26,3%	26,7%	24,5%	29,0%
2-letnie	413	16,8%	17,3%	15,4%	19,3%
3-letnie	264	14,2%	14,8%	13,0%	16,7%

Brak danych	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	681	34,1%	34,6%	30,9%	38,3%
2-letnie	232	23,1%	23,8%	20,5%	27,2%
3-letnie	157	19,7%	20,8%	17,5%	24,1%
Brak danych	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	2251	28,7%	29,1%	27,2%	31,0%
2-letnie	645	18,7%	19,3%	17,6%	21,0%
3-letnie	421	15,9%	16,6%	15,0%	18,3%

Tabela 5.29

1-roczone, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w województwie mazowieckim

	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	5167	38,4%	39,2%	37,8%	40,5%
2-letnie	1985	22,0%	22,9%	21,7%	24,1%
3-letnie	1138	15,9%	16,8%	15,7%	18,0%
	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	2865	46,9%	47,5%	45,6%	49,4%
2-letnie	1344	31,7%	32,6%	30,8%	34,4%
3-letnie	909	24,5%	25,6%	23,8%	27,3%
	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	8032	41,4%	42,2%	41,0%	43,3%
2-letnie	3329	25,5%	26,4%	25,4%	27,4%
3-letnie	2047	19,0%	20,0%	19,0%	20,9%

Tabela 5.30

1-roczone, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w województwie mazowieckim w zależności od stadium zaawansowania

Stadium miejscowe	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	374	87,7%	89,4%	85,9%	92,9%
2-letnie	328	70,3%	73,1%	68,2%	78,0%
3-letnie	263	56,7%	60,1%	54,5%	65,7%
Stadium miejscowe	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	300	91,0%	92,0%	88,7%	95,4%
2-letnie	273	80,3%	82,3%	77,6%	87,0%
3-letnie	241	70,6%	73,2%	67,5%	78,9%

Stadium miejscowe	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	674	89%	91%	88%	93%
2-letnie	601	75%	77%	74%	81%
3-letnie	504	63%	66%	62%	70%

Stadium regionalne	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	1429	54,9%	56,0%	53,3%	58,7%
2-letnie	785	30,4%	31,6%	29,0%	34,1%
3-letnie	434	20,2%	21,4%	19,1%	23,7%
Stadium regionalne	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	733	61,4%	62,2%	58,5%	65,8%
2-letnie	450	42,2%	43,2%	39,5%	47,0%
3-letnie	309	28,6%	29,8%	26,2%	33,4%
Stadium regionalne	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	2162	57,1%	58,1%	55,9%	60,2%
2-letnie	1235	34,4%	35,6%	33,4%	37,7%
3-letnie	743	23,0%	24,3%	22,3%	26,2%

Stadium uogólnione	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	2372	17,6%	18,0%	16,4%	19,6%
2-letnie	418	4,6%	4,8%	3,9%	5,7%
3-letnie	110	1,9%	2,1%	1,4%	2,7%
Stadium uogólnione	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	1239	22,3%	22,6%	20,2%	25,0%
2-letnie	276	7,2%	7,4%	5,9%	8,9%
3-letnie	89	3,4%	3,6%	2,5%	4,6%
Stadium uogólnione	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	3611	19,2%	19,6%	18,2%	20,9%
2-letnie	694	5,5%	5,7%	4,9%	6,5%
3-letnie	199	2,4%	2,6%	2,0%	3,1%

Brak danych	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	992	45,8%	46,6%	43,4%	49,9%
2-letnie	454	33,4%	34,7%	31,6%	37,8%
3-letnie	331	28,0%	29,6%	26,6%	32,7%

Brak danych	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	593	58,2%	59,0%	54,9%	63,1%
2-letnie	345	45,5%	46,8%	42,6%	51,0%
3-letnie	270	41,6%	43,4%	39,1%	47,7%
Brak danych	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	1585	50,4%	51,3%	48,7%	53,8%
2-letnie	799	37,9%	39,2%	36,7%	41,8%
3-letnie	601	33,0%	34,8%	32,2%	37,3%

Tabela 5.31

1-letnie, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w województwie mazowieckim w zależności od rodzaju leczenia

Radykalne	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	813	74,5%	75,9%	74,3%	77,5%
2-letnie	606	53,0%	55,0%	54,1%	55,9%
3-letnie	431	40,5%	42,8%	42,2%	43,5%
Radykalne	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	545	83,3%	84,2%	81,0%	87,5%
2-letnie	454	66,6%	68,1%	64,0%	72,3%
3-letnie	363	55,3%	57,3%	52,7%	61,8%
Radykalne	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	1358	78,1%	79,3%	77,0%	81,6%
2-letnie	1060	58,5%	60,3%	57,6%	63,1%
3-letnie	794	46,4%	48,7%	45,7%	51,6%

Paliatywne	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	1455	28,1%	28,6%	26,2%	31,0%
2-letnie	409	8,7%	9,0%	7,5%	10,5%
3-letnie	126	4,3%	4,5%	3,4%	5,7%
Paliatywne	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	781	32%	32%	29%	36%
2-letnie	248	13%	14%	11%	16%
3-letnie	104	6%	6%	5%	8%
Paliatywne	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	2236	29,4%	29,9%	27,9%	31,8%
2-letnie	657	10,3%	10,6%	9,3%	12,0%
3-letnie	230	4,9%	5,2%	4,2%	6,2%

Objawowe	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	1130	11,5%	11,7%	9,8%	13,7%
2-letnie	130	4,8%	5,0%	3,7%	6,3%
3-letnie	54	3,5%	3,7%	2,5%	4,9%
Objawowe	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	548	14,8%	15,0%	12,0%	18,1%
2-letnie	81	5,8%	6,1%	4,0%	8,1%
3-letnie	32	3,7%	3,9%	2,2%	5,6%
Objawowe	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	1678	12,6%	12,8%	11,2%	14,5%
2-letnie	211	5,1%	5,3%	4,2%	6,5%
3-letnie	86	3,5%	3,8%	2,8%	4,7%

Skierowany na leczenie	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	1729	47,5%	48,4%	45,9%	50,8%
2-letnie	821	29,6%	30,8%	28,5%	33,0%
3-letnie	512	22,2%	23,5%	21,3%	25,7%
Skierowany na leczenie	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	969	56,7%	57,4%	54,2%	60,6%
2-letnie	549	41,5%	42,6%	39,3%	45,8%
3-letnie	402	34,4%	35,8%	32,5%	39,1%
Skierowany na leczenie	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	2698	50,8%	51,6%	49,7%	53,6%
2-letnie	1370	33,9%	35,0%	33,2%	36,9%
3-letnie	914	26,5%	27,9%	26,1%	29,8%

Tabela 5.32

1-roczone, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w województwie mazowieckim w zależności od typu leczenia

Skojarzone	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	135	52,6%	53,5%	44,8%	62,3%
2-letnie	71	31,9%	33,0%	24,7%	41,3%
3-letnie	43	17,4%	18,4%	11,5%	25,4%

Skojarzone	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	62	41,9%	42,4%	29,7%	55,1%
2-letnie	26	27,4%	28,1%	16,5%	39,7%
3-letnie	17	16,8%	17,4%	7,4%	27,5%
Skojarzone	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	197	49,2%	50,0%	42,8%	57,2%
2-letnie	97	30,5%	31,4%	24,7%	38,2%
3-letnie	60	17,2%	18,1%	12,4%	23,8%

Nieskojarzone	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	4995	38,0%	38,7%	37,3%	40,1%
2-letnie	1899	21,7%	22,5%	21,3%	23,7%
3-letnie	1082	15,8%	16,7%	15,6%	17,8%
Nieskojarzone	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	2791	47,0%	47,6%	45,7%	49,5%
2-letnie	1311	31,7%	32,6%	30,8%	34,4%
3-letnie	886	24,6%	25,6%	23,9%	27,4%
Nieskojarzone	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	7786	41,2%	41,9%	40,8%	43,1%
2-letnie	3210	25,3%	26,2%	25,1%	27,2%
3-letnie	1968	18,9%	19,9%	19,0%	20,9%

Tabela 5.33

1-roczone, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w województwie opolskim

	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	1033	38,2%	39,0%	35,9%	42,1%
2-letnie	395	21,3%	22,1%	19,5%	24,8%
3-letnie	220	15,5%	16,4%	13,9%	18,8%
	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	519	43,7%	44,3%	39,9%	48,7%
2-letnie	227	27,2%	27,9%	23,9%	31,9%
3-letnie	141	23,0%	23,9%	20,0%	27,8%

	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	1552	40,1%	40,8%	38,2%	43,3%
2-letnie	622	23,3%	24,1%	21,9%	26,3%
3-letnie	361	18,0%	19,0%	16,9%	21,1%

Tabela 5.34

1-letnie, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w województwie opolskim w zależności od stadium zaawansowania

Stadium miejscowe	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	202	69,8%	71,2%	64,6%	77,8%
2-letnie	141	49,5%	51,5%	44,2%	58,8%
3-letnie	100	40,2%	42,8%	35,2%	50,3%
Stadium miejscowe	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	122	66,4%	67,3%	58,7%	76,0%
2-letnie	81	50,8%	52,3%	43,0%	61,6%
3-letnie	62	45,4%	47,5%	37,9%	57,0%
Stadium miejscowe	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	324	69%	70%	64%	75%
2-letnie	222	50%	52%	46%	58%
3-letnie	162	42%	45%	39%	51%

Stadium regionalne	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	432	43,1%	43,9%	39,0%	48,7%
2-letnie	186	23,1%	24,1%	19,8%	28,3%
3-letnie	100	16,4%	17,4%	13,5%	21,3%
Stadium regionalne	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	216	46,8%	47,3%	40,4%	54,2%
2-letnie	101	25,9%	26,6%	20,5%	32,7%
3-letnie	56	22,1%	22,9%	17,0%	28,9%
Stadium regionalne	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	648	44,3%	45,0%	41,1%	49,0%
2-letnie	287	24,1%	24,9%	21,4%	28,4%
3-letnie	156	18,3%	19,3%	16,0%	22,6%

Stadium uogólnione	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	399	17,0%	17,4%	13,5%	21,2%
2-letnie	68	5,0%	5,2%	2,9%	7,5%
3-letnie	20	1,9%	2,1%	0,5%	3,6%
Stadium uogólnione	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	179	24,6%	24,9%	18,4%	31,4%
2-letnie	44	12,3%	12,6%	7,6%	17,7%
3-letnie	22	9,1%	9,5%	4,9%	14,1%
Stadium uogólnione	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	578	19,4%	19,7%	16,4%	23,1%
2-letnie	112	7,3%	7,5%	5,3%	9,8%
3-letnie	42	4,2%	4,4%	2,6%	6,2%

Tabela 5.35

1-roczone, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w województwie opolskim w zależności od rodzaju leczenia

Radykalne	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	295	69,5%	70,8%	66,9%	74,6%
2-letnie	205	45,4%	47,1%	44,9%	49,4%
3-letnie	134	34,8%	36,8%	35,3%	38,3%
Radykalne	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	169	70,4%	71,1%	64,0%	78,2%
2-letnie	119	49,1%	50,1%	42,2%	57,9%
3-letnie	83	42,4%	43,7%	35,8%	51,7%
Radykalne	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	464	69,8%	70,9%	66,5%	75,2%
2-letnie	324	46,8%	48,2%	43,4%	53,0%
3-letnie	217	37,6%	39,4%	34,6%	44,2%

Paliatywne	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	375	27,2%	27,7%	23,0%	32,4%
2-letnie	102	9,9%	10,3%	7,1%	13,5%
3-letnie	37	3,9%	4,1%	1,9%	6,3%
Paliatywne	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	187	29%	30%	23%	36%
2-letnie	55	10%	10%	6%	15%
3-letnie	19	8%	9%	4%	13%

Paliatywne	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	562	27,9%	28,4%	24,5%	32,2%
2-letnie	157	10,0%	10,3%	7,7%	12,9%
3-letnie	56	5,4%	5,7%	3,6%	7,7%

Objawowe	Mężczyźni*				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	183	5,5%	5,6%	2,2%	9,0%
2-letnie	10	-	-	-	-
3-letnie	2	-	-	-	-
Objawowe	Kobiety*				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	78	-	-	-	-
2-letnie	7	-	-	-	-
3-letnie	4	-	-	-	-
Objawowe	Obie płcie*				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	261	6,5%	6,7%	3,5%	9,8%
2-letnie	17	-	-	-	-
3-letnie	6	-	-	-	-

*Mała liczba przypadków, niska wiarygodność wyników

Skierowany na leczenie	Mężczyźni*				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	175	43,4%	44,2%	36,6%	51,9%
2-letnie	76	-	-	-	-
3-letnie	46	-	-	-	-
Skierowany na leczenie	Kobiety*				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	83	-	-	-	-
2-letnie	46	-	-	-	-
3-letnie	35	-	-	-	-
Skierowany na leczenie	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	258	47,3%	48,1%	41,8%	54,5%
2-letnie	122	31,4%	32,6%	26,6%	38,5%
3-letnie	81	27,7%	29,3%	23,3%	35,2%

*Mała liczba przypadków, niska wiarygodność wyników

Tabela 5.36

1-letnie, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w województwie opolskim w zależności od typu leczenia

Skojarzone	Mężczyźni*				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	24	-	-	-	-
2-letnie	13	-	-	-	-
3-letnie	8	-	-	-	-
Skojarzone	Kobiety*				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	18	-	-	-	-
2-letnie	12	-	-	-	-
3-letnie	6	-	-	-	-
Skojarzone	Obie płcie*				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	42	-	-	-	-
2-letnie	25	-	-	-	-
3-letnie	14	-	-	-	-

*Mała liczba przypadków, niska wiarygodność wyników

Nieskojarzone	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	840	36,9%	37,6%	34,2%	41,0%
2-letnie	310	19,9%	20,7%	17,8%	23,5%
3-letnie	167	13,9%	14,8%	12,2%	17,4%
Nieskojarzone	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	422	41,5%	42,0%	37,1%	46,8%
2-letnie	175	24,6%	25,3%	21,0%	29,6%
3-letnie	104	20,6%	21,5%	17,3%	25,6%
Nieskojarzone	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	1262	38,4%	39,1%	36,3%	41,9%
2-letnie	485	21,5%	22,2%	19,8%	24,6%
3-letnie	271	16,2%	17,1%	14,8%	19,3%

Brak danych	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	169	42,6%	43,4%	35,7%	51,2%
2-letnie	72	26,6%	27,7%	20,6%	34,7%
3-letnie	45	23,8%	25,2%	18,2%	32,2%

Brak danych	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	79	-	-	-	-
2-letnie	40	-	-	-	-
3-letnie	31	-	-	-	-
Brak danych	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	248	45,2%	46,0%	39,6%	52,4%
2-letnie	112	30,6%	31,8%	25,7%	37,9%
3-letnie	76	26,8%	28,4%	22,3%	34,4%

*Mała liczba przypadków, niska wiarygodność wyników

Tabela 5.37

1-roczone, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w województwie podkarpackim

	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	2049	38,9%	39,7%	37,5%	41,8%
2-letnie	797	22,7%	23,7%	21,7%	25,6%
3-letnie	466	17,2%	18,3%	16,5%	20,1%
	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	785	47,4%	48,0%	44,4%	51,6%
2-letnie	372	32,2%	33,1%	29,6%	36,5%
3-letnie	253	24,8%	22,6%	19,3%	25,9%
	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	2834	41,2%	42,0%	40,1%	43,9%
2-letnie	1169	25,4%	26,3%	24,6%	28,0%
3-letnie	719	19,3%	20,4%	18,8%	22,0%

Tabela 5.38

1-roczone, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w województwie podkarpackim w zależności od stadium zaawansowania

Stadium miejscowe	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	396	70,7%	72,0%	67,4%	76,7%
2-letnie	280	54,3%	56,4%	51,2%	61,6%
3-letnie	215	47,2%	50,0%	44,5%	55,5%
Stadium miejscowe	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	165	81,8%	82,8%	76,7%	88,8%
2-letnie	135	69,1%	70,7%	63,4%	78,1%
3-letnie	114	59,6%	61,8%	53,6%	70,0%

Stadium miejscowe	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	561	74%	75%	71%	79%
2-letnie	415	59%	61%	56%	65%
3-letnie	329	51%	54%	49%	58%

Stadium regionalne	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	562	45,6%	46,5%	42,2%	50,7%
2-letnie	256	26,5%	27,6%	23,7%	31,5%
3-letnie	149	18,2%	19,4%	15,8%	22,9%
Stadium regionalne	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	194	53,1%	53,7%	46,4%	60,9%
2-letnie	103	37,1%	37,9%	30,9%	45,0%
3-letnie	72	24,2%	25,0%	18,4%	31,5%
Stadium regionalne	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	756	47,5%	48,3%	44,6%	52,0%
2-letnie	359	29,2%	30,3%	26,9%	33,7%
3-letnie	221	19,7%	20,8%	17,7%	24,0%

Stadium uogólnione	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	876	21,6%	22,0%	19,2%	24,8%
2-letnie	189	6,7%	7,0%	5,2%	8,8%
3-letnie	59	3,5%	3,7%	2,3%	5,1%
Stadium uogólnione	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	318	26,7%	27,1%	22,0%	32,1%
2-letnie	85	10,4%	10,6%	7,1%	14,2%
3-letnie	33	6,4%	6,6%	3,7%	9,6%
Stadium uogólnione	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	1194	22,9%	23,3%	20,9%	25,8%
2-letnie	274	7,7%	8,0%	6,4%	9,6%
3-letnie	92	4,3%	4,5%	3,2%	5,8%

Brak danych	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	215	33,5%	34,2%	27,6%	40,8%
2-letnie	72	20,0%	20,9%	15,2%	26,6%
3-letnie	43	16,3%	17,4%	11,8%	22,9%
Brak danych	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	108	45,4%	46,1%	36,4%	55,9%
2-letnie	49	31,5%	32,6%	23,3%	41,8%
3-letnie	34	27,1%	28,6%	19,4%	37,7%
Brak danych	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	323	37,5%	38,2%	32,7%	43,7%
2-letnie	121	23,8%	24,8%	19,9%	29,7%
3-letnie	77	20,0%	21,2%	16,4%	26,0%

Tabela 5.39

1-roczone, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w województwie podkarpackim w zależności od rodzaju leczenia

Radykalne	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	307	72,0%	73,2%	70,4%	76,0%
2-letnie	221	60,6%	62,7%	60,9%	64,5%
3-letnie	186	53,4%	56,3%	54,9%	57,6%
Radykalne	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	138	85,5%	86,3%	80,2%	92,3%
2-letnie	118	64,5%	65,7%	57,4%	74,0%
3-letnie	89	58,7%	60,4%	51,7%	69,2%
Radykalne	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	445	76,2%	77,3%	73,2%	81,4%
2-letnie	339	61,8%	63,6%	58,9%	68,4%
3-letnie	275	55,0%	57,6%	52,5%	62,6%

Paliatywne	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	549	34,8%	35,4%	31,3%	39,6%
2-letnie	191	13,5%	14,0%	11,0%	17,0%
3-letnie	74	6,8%	7,3%	4,9%	9,6%

Paliatywne	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	191	38%	39%	32%	46%
2-letnie	73	19%	20%	14%	26%
3-letnie	37	8%	9%	4%	13%
Paliatywne	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	740	35,7%	36,3%	32,7%	39,9%
2-letnie	264	15,0%	15,5%	12,8%	18,2%
3-letnie	111	7,2%	7,6%	5,5%	9,7%

Objawowe	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	536	21,6%	22,1%	18,5%	25,7%
2-letnie	116	6,9%	7,2%	4,9%	9,5%
3-letnie	37	2,6%	2,8%	1,3%	4,3%
Objawowe	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	196	25,5%	25,9%	19,6%	32,2%
2-letnie	50	12,8%	13,2%	8,3%	18,1%
3-letnie	25	5,5%	5,8%	2,3%	9,4%
Objawowe	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	732	22,7%	23,1%	20,0%	26,3%
2-letnie	166	8,5%	8,8%	6,7%	11,0%
3-letnie	62	3,4%	3,6%	2,2%	5,1%

Skierowany na leczenie	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	616	42,2%	43,0%	39,0%	47,1%
2-letnie	260	26,9%	28,0%	24,3%	31,8%
3-letnie	166	22,5%	23,9%	20,3%	27,6%
Skierowany na leczenie	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	245	51,0%	51,6%	45,2%	58,1%
2-letnie	125	39,6%	40,6%	34,2%	47,0%
3-letnie	97	34,0%	35,3%	28,8%	41,8%
Skierowany na leczenie	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	861	44,7%	45,5%	42,1%	48,9%
2-letnie	385	30,5%	31,6%	28,4%	34,9%
3-letnie	263	25,8%	27,2%	24,0%	30,5%

Tabela 5.40

1-letnie, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w województwie podkarpackim w zależności od typu leczenia

Skojarzone	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	116	57,8%	58,7%	49,4%	68,1%
2-letnie	67	31,0%	32,1%	23,2%	41,0%
3-letnie	36	21,5%	22,6%	14,4%	30,8%
Skojarzone	Kobiety*				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	59	-	-	-	-
2-letnie	38	-	-	-	-
3-letnie	21	-	-	-	-
Skojarzone	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	175	60,0%	60,8%	53,3%	68,4%
2-letnie	105	32,6%	33,5%	26,2%	40,8%
3-letnie	57	22,2%	23,2%	16,6%	29,9%

*Mała liczba przypadków, niska wiarygodność wyników

Nieskojarzone	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	1307	45,7%	46,5%	43,7%	49,3%
2-letnie	597	26,5%	27,5%	24,9%	30,0%
3-letnie	346	19,5%	20,6%	18,2%	23,0%
Nieskojarzone	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	493	55,4%	56,0%	51,4%	60,5%
2-letnie	273	36,7%	37,5%	33,1%	42,0%
3-letnie	181	28,5%	29,5%	25,2%	33,8%
Nieskojarzone	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	1800	48,3%	49,1%	46,7%	51,5%
2-letnie	870	29,3%	30,3%	28,0%	32,5%
3-letnie	527	22,0%	23,1%	21,0%	25,2%

Brak danych	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	626	21,2%	21,7%	18,4%	25,1%
2-letnie	133	13,4%	14,0%	11,2%	16,9%
3-letnie	84	12,0%	12,8%	10,0%	15,6%

Brak danych	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	233	26,2%	26,6%	20,8%	32,5%
2-letnie	61	21,9%	22,7%	17,1%	28,3%
3-letnie	51	17,2%	18,1%	12,8%	23,5%
Brak danych	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	859	22,6%	23,1%	20,1%	26,0%
2-letnie	194	15,7%	16,4%	13,8%	19,0%
3-letnie	135	13,3%	14,2%	11,7%	16,7%

Tabela 5.41

1-roczone, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w województwie podlaskim

	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	1077	39,8%	40,6%	37,6%	43,6%
2-letnie	429	22,2%	23,1%	20,4%	25,7%
3-letnie	239	15,9%	16,8%	14,4%	19,3%
	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	478	49,6%	50,2%	45,5%	54,8%
2-letnie	237	29,1%	29,8%	25,5%	34,0%
3-letnie	139	22,3%	23,1%	19,1%	27,2%
	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	1555	42,8%	43,5%	41,0%	46,1%
2-letnie	666	24,3%	25,1%	22,9%	27,4%
3-letnie	378	17,8%	18,8%	16,7%	20,9%

Tabela 5.42

1-roczone, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w województwie podlaskim w zależności od stadium zaawansowania

Stadium miejscowe	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	225	68,0%	69,3%	63,0%	75,6%
2-letnie	153	48,9%	50,8%	43,9%	57,7%
3-letnie	110	38,3%	40,6%	33,5%	47,7%

Stadium miejscowe	Kobiety*				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	107	-	-	-	-
2-letnie	79	-	-	-	-
3-letnie	66	-	-	-	-
Stadium miejscowe	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	332	70%	71%	66%	76%
2-letnie	232	53%	55%	49%	60%
3-letnie	176	43%	45%	40%	51%

*Mała liczba przypadków, niska wiarygodność wyników

Stadium regionalne	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	363	47,4%	48,3%	43,0%	53,6%
2-letnie	172	23,1%	24,1%	19,5%	28,7%
3-letnie	84	15,9%	16,9%	12,7%	21,1%
Stadium regionalne	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	152	57,9%	58,6%	50,5%	66,7%
2-letnie	88	33,6%	34,3%	26,5%	42,2%
3-letnie	51	23,4%	24,3%	16,9%	31,7%
Stadium regionalne	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	515	50,5%	51,3%	46,9%	55,8%
2-letnie	260	26,2%	27,1%	23,1%	31,1%
3-letnie	135	18,1%	19,1%	15,4%	22,8%

Stadium uogólnione	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	487	21,2%	21,5%	17,8%	25,3%
2-letnie	103	9,0%	9,4%	6,7%	12,1%
3-letnie	44	5,4%	5,7%	3,5%	8,0%
Stadium uogólnione	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	218	32,1%	32,5%	26,1%	38,9%
2-letnie	70	10,1%	10,4%	6,2%	14,5%
3-letnie	22	6,3%	6,5%	3,0%	10,1%
Stadium uogólnione	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	705	24,5%	25,0%	21,7%	28,2%
2-letnie	173	9,4%	9,7%	7,4%	12,0%
3-letnie	66	5,7%	6,0%	4,1%	7,9%

Tabela 5.43

1-letnie, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w województwie podlaskim w zależności od rodzaju leczenia

Radykalne	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	91	79,1%	80,5%	76,8%	84,3%
2-letnie	72	57,1%	59,2%	56,5%	61,9%
3-letnie	52	45,7%	48,3%	46,1%	50,5%
Radykalne	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	47	-	-	-	-
2-letnie	43	-	-	-	-
3-letnie	35	-	-	-	-
Radykalne	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	138	83,3%	84,6%	78,1%	91,0%
2-letnie	115	63,0%	65,0%	56,5%	73,4%
3-letnie	87	50,4%	52,8%	43,6%	62,0%

*Mała liczba przypadków, niska wiarygodność wyników

Paliatywne	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	563	40,0%	40,7%	36,5%	44,9%
2-letnie	225	18,7%	19,3%	15,9%	22,7%
3-letnie	105	12,4%	13,0%	10,0%	16,1%
Paliatywne	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	266	52%	52%	46%	59%
2-letnie	138	22%	23%	17%	28%
3-letnie	59	15%	16%	11%	21%
Paliatywne	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	829	43,8%	44,4%	40,9%	47,9%
2-letnie	363	19,8%	20,4%	17,5%	23,2%
3-letnie	164	13,3%	14,0%	11,4%	16,5%

Objawowe	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	250	19,6%	20,0%	14,9%	25,2%
2-letnie	49	10,4%	10,9%	6,8%	14,9%
3-letnie	26	6,2%	6,7%	3,3%	10,1%

Objawowe	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	80	13,8%	14,0%	6,2%	21,9%
2-letnie	11	8,8%	9,1%	2,5%	15,7%
3-letnie	7	6,1%	6,5%	0,7%	12,2%
Objawowe	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	330	18,2%	18,6%	14,2%	22,9%
2-letnie	60	10,0%	10,4%	7,0%	13,9%
3-letnie	33	6,2%	6,6%	3,7%	9,6%

Skierowany na leczenie	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	166	48,2%	49,2%	41,3%	57,1%
2-letnie	80	32,5%	33,9%	26,3%	41,5%
3-letnie	54	26,2%	27,8%	20,4%	35,3%
Skierowany na leczenie	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	77	-	-	-	-
2-letnie	44	-	-	-	-
3-letnie	37	-	-	-	-
Skierowany na leczenie	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	243	51,0%	51,9%	45,4%	58,5%
2-letnie	124	37,4%	38,8%	32,4%	45,3%
3-letnie	91	31,0%	32,7%	26,3%	39,2%

*Mała liczba przypadków, niska wiarygodność wyników

Tabela 5.44

1-roczone, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w województwie podlaskim w zależności od typu leczenia

Skojarzone	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	44				
2-letnie	20				
3-letnie	10				
Skojarzone	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	14				
2-letnie	6				
3-letnie	2				

Skojarzone	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	58	-	-	-	-
2-letnie	26	-	-	-	-
3-letnie	12	-	-	-	-

*Mała liczba przypadków, niska wiarygodność wyników

Nieskojarzone	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	890	38,3%	39,0%	35,7%	42,4%
2-letnie	341	20,6%	21,4%	18,5%	24,2%
3-letnie	183	14,6%	15,5%	12,9%	18,1%
Nieskojarzone	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	396	48,5%	49,0%	44,0%	54,1%
2-letnie	192	25,8%	26,4%	21,9%	30,9%
3-letnie	102	18,6%	19,3%	15,1%	23,4%
Nieskojarzone	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	1286	41,4%	42,1%	39,3%	44,9%
2-letnie	533	22,2%	22,9%	20,5%	25,3%
3-letnie	285	15,8%	16,7%	14,5%	18,9%

Brak danych	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	143	47,6%	48,6%	40,0%	57,1%
2-letnie	68	32,2%	33,5%	25,4%	41,7%
3-letnie	46	24,7%	26,4%	18,5%	34,3%
Brak danych	Kobiety*				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	68	-	-	-	-
2-letnie	39	-	-	-	-
3-letnie	35	-	-	-	-
Brak danych	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	211	50,7%	51,7%	44,7%	58,7%
2-letnie	107	38,4%	39,9%	32,9%	46,8%
3-letnie	81	31,5%	33,3%	26,4%	40,3%

*Mała liczba przypadków, niska wiarygodność wyników

Tabela 5.45

1-letnie, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w województwie pomorskim

	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	3025	39,4%	40,2%	38,3%	42,0%
2-letnie	1191	24,6%	25,6%	23,9%	27,2%
3-letnie	743	18,6%	19,7%	18,2%	21,3%
	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	1779	47,6%	48,3%	45,9%	50,7%
2-letnie	847	32,7%	33,6%	31,3%	35,9%
3-letnie	580	25,7%	26,8%	24,6%	29,0%
	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	4804	42,4%	43,2%	41,7%	44,6%
2-letnie	2038	27,6%	28,6%	27,2%	29,9%
3-letnie	1323	21,2%	22,4%	21,1%	23,7%

Tabela 5.46

1-letnie, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w województwie pomorskim w zależności od stadium zaawansowania

Stadium miejscowe	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	556	73,7%	75,3%	71,5%	79,1%
2-letnie	410	60,6%	63,2%	58,9%	67,5%
3-letnie	337	53,2%	56,6%	52,0%	61,3%
Stadium miejscowe	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	403	81,9%	83,0%	79,1%	86,9%
2-letnie	330	72,5%	74,4%	69,9%	79,0%
3-letnie	292	64,9%	67,7%	62,6%	72,8%
Stadium miejscowe	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	959	77%	79%	76%	81%
2-letnie	740	66%	68%	65%	71%
3-letnie	629	58%	61%	58%	65%

Stadium regionalne	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	755	50,7%	51,7%	48,0%	55,4%
2-letnie	383	30,9%	32,1%	28,6%	35,6%
3-letnie	233	21,9%	23,3%	20,0%	26,6%

Stadium regionalne	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	392	56,1%	56,9%	51,8%	61,9%
2-letnie	220	36,4%	37,4%	32,4%	42,4%
3-letnie	142	24,2%	25,3%	20,6%	29,9%
Stadium regionalne	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	1147	52,6%	53,5%	50,5%	56,5%
2-letnie	603	32,8%	33,9%	31,1%	36,8%
3-letnie	375	22,7%	24,0%	21,3%	26,6%

Stadium uogólnione	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	1408	21,5%	21,9%	19,7%	24,2%
2-letnie	303	7,9%	8,2%	6,7%	9,7%
3-letnie	111	3,8%	4,0%	2,9%	5,1%
Stadium uogólnione	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	785	27,0%	27,4%	24,2%	30,6%
2-letnie	212	12,0%	12,3%	9,9%	14,7%
3-letnie	94	7,3%	7,6%	5,6%	9,6%
Stadium uogólnione	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	2193	23,5%	23,9%	22,0%	25,7%
2-letnie	515	9,3%	9,7%	8,4%	11,0%
3-letnie	205	5,0%	5,3%	4,3%	6,3%

Brak danych	Mężczyźni*				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	307	30,9%	31,6%	26,2%	37,0%
2-letnie	95	-	-	-	-
3-letnie	62	-	-	-	-
Brak danych	Kobiety*				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	200	-	-	-	-
2-letnie	85	-	-	-	-
3-letnie	52	-	-	-	-
Brak danych	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	507	35,5%	36,2%	31,9%	40,5%
2-letnie	180	22,5%	23,4%	19,5%	27,3%
3-letnie	114	18,5%	19,7%	16,0%	23,4%

*Mała liczba przypadków, niska wiarygodność wyników

Tabela 5.47

1-letnie, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w województwie pomorskim w zależności od rodzaju leczenia

Radykalne	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	354	76,0%	77,5%	75,2%	79,7%
2-letnie	269	61,6%	64,1%	62,6%	65,6%
3-letnie	218	52,5%	55,7%	54,6%	56,9%
Radykalne	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	231	86,1%	87,1%	82,5%	91,7%
2-letnie	199	75,8%	77,5%	71,7%	83,3%
3-letnie	175	66,2%	68,6%	61,9%	75,2%
Radykalne	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	585	80,0%	81,3%	77,9%	84,7%
2-letnie	468	67,2%	69,4%	65,4%	73,4%
3-letnie	393	57,9%	60,9%	56,5%	65,3%

Paliatywne	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	522	21,8%	22,3%	18,6%	26,0%
2-letnie	114	8,0%	8,4%	5,9%	10,9%
3-letnie	42	3,6%	3,8%	2,0%	5,6%
Paliatywne	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	306	28%	28%	23%	33%
2-letnie	85	11%	11%	7%	15%
3-letnie	33	6%	6%	3%	9%
Paliatywne	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	828	24,0%	24,5%	21,4%	27,5%
2-letnie	199	9,1%	9,4%	7,3%	11,5%
3-letnie	75	4,4%	4,7%	3,1%	6,2%

Objawowe	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	566	22,3%	22,7%	19,1%	26,3%
2-letnie	126	10,8%	11,2%	8,5%	13,9%
3-letnie	61	7,6%	8,1%	5,7%	10,5%
Objawowe	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	290	31,0%	31,5%	26,0%	37,1%
2-letnie	90	21,0%	21,7%	16,8%	26,7%
3-letnie	61	14,8%	15,6%	11,1%	20,1%

Objawowe	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	856	25,2%	25,7%	22,7%	28,7%
2-letnie	216	14,3%	14,8%	12,3%	17,3%
3-letnie	122	10,1%	10,7%	8,4%	12,9%

Skierowany na leczenie	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	1455	44,0%	44,9%	42,2%	47,5%
2-letnie	640	27,8%	28,9%	26,5%	31,3%
3-letnie	404	20,7%	22,0%	19,7%	24,3%
Skierowany na leczenie	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	868	49,7%	50,3%	46,9%	53,8%
2-letnie	431	32,9%	33,9%	30,6%	37,1%
3-letnie	285	25,6%	26,7%	23,5%	29,9%
Skierowany na leczenie	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	2323	46,1%	46,9%	44,8%	49,0%
2-letnie	1071	29,7%	30,8%	28,8%	32,7%
3-letnie	689	22,5%	23,8%	21,9%	25,6%

Brak danych	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	112	33,9%	34,6%	25,5%	43,8%
2-letnie	38	13,4%	14,0%	7,3%	20,7%
3-letnie	15	10,2%	10,9%	4,6%	17,1%
Brak danych	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	77	50,6%	51,3%	39,7%	62,8%
2-letnie	39	32,5%	33,3%	22,4%	44,3%
3-letnie	25	25,4%	26,5%	15,6%	37,3%
Brak danych	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	189	40,7%	41,5%	34,2%	48,7%
2-letnie	77	21,2%	21,9%	15,8%	28,1%
3-letnie	40	16,4%	17,3%	11,4%	23,2%

Tabela 5.48

1-letnie, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w województwie pomorskim w zależności od typu leczenia

Skojarzone	Mężczyźni*				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	105	-	-	-	-
2-letnie	69	-	-	-	-
3-letnie	41	-	-	-	-
Skojarzone	Kobiety*				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	73	-	-	-	-
2-letnie	54	-	-	-	-
3-letnie	39	-	-	-	-
Skojarzone	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	178	69,1%	70,1%	63,1%	77,1%
2-letnie	123	44,9%	46,3%	38,6%	53,9%
3-letnie	80	28,8%	30,1%	22,7%	37,5%

*Mała liczba przypadków, niska wiarygodność wyników

Nieskojarzone	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	2121	42,1%	42,9%	40,7%	45,1%
2-letnie	893	26,1%	27,2%	25,2%	29,2%
3-letnie	554	19,5%	20,7%	18,9%	22,6%
Nieskojarzone	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	1257	50,8%	51,5%	48,7%	54,4%
2-letnie	639	34,8%	35,7%	33,0%	38,5%
3-letnie	437	27,2%	28,4%	25,7%	31,1%
Nieskojarzone	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	3378	45,4%	46,1%	44,4%	47,9%
2-letnie	1532	29,3%	30,4%	28,8%	32,0%
3-letnie	991	22,4%	23,6%	22,1%	25,2%

Brak danych	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	800	28,6%	29,2%	26,0%	32,5%
2-letnie	229	18,5%	19,3%	16,4%	22,1%
3-letnie	148	15,2%	16,2%	13,5%	19,0%

Brak danych	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	450	34,2%	34,7%	30,2%	39,3%
2-letnie	154	23,3%	24,0%	19,9%	28,1%
3-letnie	104	20,0%	21,0%	17,0%	25,1%
Brak danych	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	1250	30,6%	31,2%	28,6%	33,9%
2-letnie	383	20,2%	21,0%	18,6%	23,4%
3-letnie	252	17,0%	18,0%	15,7%	20,3%

Tabela 5.49

1-roczone, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w województwie śląskim

	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	5447	36,7%	37,4%	36,1%	38,7%
2-letnie	1997	20,9%	21,8%	20,7%	22,9%
3-letnie	1140	15,7%	16,7%	15,6%	17,8%
	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	2914	44,8%	45,4%	43,6%	47,3%
2-letnie	1306	29,9%	30,7%	29,0%	32,5%
3-letnie	870	23,1%	24,2%	22,5%	25,8%
	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	8361	39,5%	40,2%	39,1%	41,3%
2-letnie	3303	24,0%	24,9%	24,0%	25,9%
3-letnie	2010	18,3%	19,3%	18,4%	20,3%

Tabela 5.50

1-roczone, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w województwie śląskim w zależności od stadium zaawansowania

Stadium miejscowe	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	771	72,8%	74,3%	71,0%	77,5%
2-letnie	561	55,1%	57,5%	53,7%	61,2%
3-letnie	425	45,8%	48,8%	44,8%	52,7%
Stadium miejscowe	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	486	78,4%	79,5%	75,7%	83,3%
2-letnie	381	66,3%	68,2%	63,8%	72,6%
3-letnie	322	56,4%	58,9%	54,0%	63,7%

Stadium miejscowe	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	1257	75%	76%	74%	79%
2-letnie	942	59%	62%	59%	65%
3-letnie	747	50%	53%	50%	56%

Stadium regionalne	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	1426	38,9%	39,7%	37,1%	42,3%
2-letnie	555	19,2%	20,0%	17,8%	22,2%
3-letnie	274	13,7%	14,6%	12,6%	16,5%
Stadium regionalne	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	712	49,6%	50,2%	46,4%	54,0%
2-letnie	353	29,4%	30,2%	26,7%	33,7%
3-letnie	209	20,8%	21,6%	18,4%	24,9%
Stadium regionalne	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	2138	42,5%	43,2%	41,1%	45,4%
2-letnie	908	22,6%	23,4%	21,5%	25,3%
3-letnie	483	16,0%	16,9%	15,2%	18,7%

Stadium uogólnione	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	2032	19,2%	19,6%	17,8%	21,4%
2-letnie	391	6,3%	6,6%	5,5%	7,7%
3-letnie	129	3,3%	3,5%	2,7%	4,4%
Stadium uogólnione	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	1066	24,4%	24,7%	22,0%	27,4%
2-letnie	260	9,6%	9,8%	8,0%	11,7%
3-letnie	102	5,3%	5,5%	4,0%	6,9%
Stadium uogólnione	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	3098	21,0%	21,4%	19,9%	22,9%
2-letnie	651	7,5%	7,7%	6,7%	8,7%
3-letnie	231	4,0%	4,2%	3,4%	5,0%

Brak danych	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	1218	40,2%	41,1%	38,2%	43,9%
2-letnie	490	25,6%	26,7%	24,1%	29,3%
3-letnie	312	20,0%	21,3%	18,7%	23,8%

Brak danych	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	650	48,0%	48,7%	44,8%	52,7%
2-letnie	312	36,5%	37,6%	33,7%	41,5%
3-letnie	237	30,5%	32,0%	28,1%	35,9%
Brak danych	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	1868	42,9%	43,7%	41,4%	46,1%
2-letnie	802	29,4%	30,5%	28,3%	32,7%
3-letnie	549	23,6%	25,1%	22,9%	27,2%

Tabela 5.51

1-roczone, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w województwie śląskim w zależności od rodzaju leczenia

Radykalne	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	604	75,2%	76,6%	74,8%	78,4%
2-letnie	454	56,5%	58,6%	57,5%	59,8%
3-letnie	341	46,9%	49,7%	48,9%	50,6%
Radykalne	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	365	86,6%	87,5%	83,9%	91,2%
2-letnie	316	71,8%	73,5%	68,6%	78,3%
3-letnie	262	62,6%	64,9%	59,5%	70,3%
Radykalne	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	969	79,5%	80,7%	78,1%	83,4%
2-letnie	770	62,2%	64,3%	61,1%	67,5%
3-letnie	603	52,8%	55,5%	52,1%	58,9%

Paliatywne	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	1849	25,9%	26,4%	24,3%	28,5%
2-letnie	478	9,1%	9,5%	8,1%	10,9%
3-letnie	168	4,9%	5,2%	4,1%	6,3%
Paliatywne	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	905	34%	34%	31%	37%
2-letnie	305	15%	16%	13%	18%
3-letnie	137	8%	8%	6%	10%
Paliatywne	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	2754	28,4%	28,9%	27,2%	30,7%
2-letnie	783	11,1%	11,5%	10,2%	12,7%
3-letnie	305	6,0%	6,3%	5,3%	7,3%

Objawowe	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	640	11,6%	11,8%	9,2%	14,4%
2-letnie	74	4,2%	4,4%	2,7%	6,1%
3-letnie	27	2,4%	2,6%	1,3%	3,9%
Objawowe	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	325	14,8%	15,0%	11,0%	19,0%
2-letnie	48	5,2%	5,4%	2,9%	8,0%
3-letnie	17	2,9%	3,1%	1,1%	5,1%
Objawowe	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	965	12,6%	12,9%	10,7%	15,1%
2-letnie	122	4,6%	4,8%	3,4%	6,2%
3-letnie	44	2,6%	2,7%	1,6%	3,9%

Skierowany na leczenie	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	1419	44,5%	45,4%	42,7%	48,0%
2-letnie	631	28,0%	29,2%	26,7%	31,7%
3-letnie	398	21,9%	23,3%	20,9%	25,7%
Skierowany na leczenie	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	786	51,0%	51,7%	48,1%	55,3%
2-letnie	401	36,8%	37,8%	34,2%	41,3%
3-letnie	289	29,2%	30,4%	27,0%	33,9%
Skierowany na leczenie	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	2205	46,8%	47,6%	45,5%	49,8%
2-letnie	1032	31,2%	32,3%	30,2%	34,3%
3-letnie	687	24,5%	25,9%	23,9%	27,8%

Brak danych	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	904	38,5%	39,3%	36,0%	42,6%
2-letnie	348	22,0%	22,9%	20,1%	25,8%
3-letnie	199	17,2%	18,3%	15,5%	21,1%
Brak danych	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	515	44,3%	44,9%	40,5%	49,3%
2-letnie	228	30,7%	31,6%	27,4%	35,8%
3-letnie	158	26,1%	27,3%	23,1%	31,5%

Brak danych	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	1419	40,6%	41,3%	38,7%	44,0%
2-letnie	576	25,2%	26,1%	23,7%	28,5%
3-letnie	357	20,4%	21,6%	19,2%	24,0%

Tabela 5.52

1-roczone, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w województwie śląskim w zależności od typu leczenia

Skojarzone	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	188	42,6%	43,3%	36,0%	50,6%
2-letnie	80	21,3%	22,1%	15,9%	28,2%
3-letnie	40	16,3%	17,3%	11,4%	23,1%
Skojarzone	Kobiety*				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	77	-	-	-	-
2-letnie	49	-	-	-	-
3-letnie	23	-	-	-	-
Skojarzone	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	265	48,7%	49,4%	43,2%	55,7%
2-letnie	129	23,8%	24,5%	19,1%	29,9%
3-letnie	63	19,0%	19,9%	14,8%	25,1%

*Mała liczba przypadków, niska wiarygodność wyników

Nieskojarzone	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	2898	38,8%	39,5%	37,7%	41,4%
2-letnie	1123	20,9%	21,8%	20,2%	23,4%
3-letnie	607	15,2%	16,1%	14,7%	17,6%
Nieskojarzone	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	1590	47,8%	48,4%	45,9%	51,0%
2-letnie	760	30,9%	31,7%	29,3%	34,1%
3-letnie	491	23,1%	24,0%	21,8%	26,3%
Nieskojarzone	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	4488	42,0%	42,7%	41,2%	44,2%
2-letnie	1883	24,5%	25,3%	24,0%	26,7%
3-letnie	1098	18,0%	19,0%	17,7%	20,2%

Brak danych	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	2361	33,6%	34,3%	32,3%	36,3%
2-letnie	794	20,9%	21,8%	20,0%	23,5%
3-letnie	493	16,4%	17,5%	15,8%	19,1%
Brak danych	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	1247	39,9%	40,5%	37,7%	43,3%
2-letnie	497	28,5%	29,5%	26,8%	32,1%
3-letnie	356	23,1%	24,3%	21,7%	26,8%
Brak danych	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	3608	35,8%	36,5%	34,8%	38,1%
2-letnie	1291	23,5%	24,4%	23,0%	25,9%
3-letnie	849	18,7%	19,8%	18,4%	21,3%

Tabela 5.53

1-roczone, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w województwie świętokrzyskim

	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	1763	36,0%	36,7%	34,3%	39,0%
2-letnie	634	19,8%	20,6%	18,6%	22,6%
3-letnie	349	15,0%	15,9%	14,0%	17,7%
	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	624	44,9%	45,4%	41,4%	49,5%
2-letnie	280	27,6%	28,3%	24,6%	31,9%
3-letnie	172	21,9%	22,8%	19,2%	26,3%
	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	2387	38,3%	39,0%	36,9%	41,0%
2-letnie	914	21,8%	22,6%	20,9%	24,4%
3-letnie	521	16,8%	17,7%	16,1%	19,4%

Tabela 5.54

1-roczone, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w województwie świętokrzyskim w zależności od stadium zaawansowania

Stadium miejscowe	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	293	69,6%	71,0%	65,5%	76,5%
2-letnie	204	54,3%	56,5%	50,4%	62,5%
3-letnie	159	47,1%	50,0%	43,7%	56,3%

Stadium miejscowe	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	95	81,1%	82,0%	73,9%	90,2%
2-letnie	77	73,7%	75,5%	66,3%	84,8%
3-letnie	70	64,7%	67,2%	56,7%	77,8%
Stadium miejscowe	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	388	72%	74%	69%	78%
2-letnie	281	59%	61%	56%	66%
3-letnie	229	51%	54%	49%	60%

Stadium regionalne	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	376	41,0%	41,8%	36,6%	46,9%
2-letnie	154	18,6%	19,4%	15,2%	23,5%
3-letnie	70	11,7%	12,4%	8,8%	16,0%
Stadium regionalne	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	122	57,4%	58,0%	49,0%	67,1%
2-letnie	70	27,9%	28,5%	20,2%	36,9%
3-letnie	34	24,7%	25,6%	17,4%	33,9%
Stadium regionalne	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	498	45,0%	45,8%	41,2%	50,3%
2-letnie	224	20,9%	21,6%	17,9%	25,4%
3-letnie	104	14,7%	15,5%	12,1%	19,0%

Stadium uogólnione	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	677	21,0%	21,4%	18,2%	24,6%
2-letnie	142	7,2%	7,5%	5,5%	9,6%
3-letnie	49	3,9%	4,2%	2,6%	5,8%
Stadium uogólnione	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	258	25,2%	25,5%	20,0%	31,0%
2-letnie	65	8,1%	8,3%	4,9%	11,8%
3-letnie	21	3,1%	3,3%	0,9%	5,6%
Stadium uogólnione	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	935	22,1%	22,5%	19,8%	25,3%
2-letnie	207	7,5%	7,8%	6,0%	9,5%
3-letnie	70	3,7%	3,9%	2,6%	5,3%

Brak danych	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	417	32,1%	32,8%	28,1%	37,4%
2-letnie	134	17,0%	17,7%	13,9%	21,6%
3-letnie	71	13,4%	14,3%	10,7%	17,8%
Brak danych	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	149	45,6%	46,3%	38,0%	54,6%
2-letnie	68	31,5%	32,5%	24,6%	40,3%
3-letnie	47	25,5%	26,7%	19,1%	34,3%
Brak danych	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	566	35,7%	36,4%	32,2%	40,5%
2-letnie	202	20,8%	21,6%	18,1%	25,2%
3-letnie	118	16,6%	17,6%	14,2%	20,9%

Tabela 5.55

1-roczone, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w województwie świętokrzyskim w zależności od rodzaju leczenia

Radykalne	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	119	71,4%	72,7%	69,6%	75,9%
2-letnie	85	53,8%	55,8%	53,8%	57,9%
3-letnie	64	44,4%	47,0%	45,4%	48,7%
Radykalne	Kobiety*				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	45	-	-	-	-
2-letnie	37	-	-	-	-
3-letnie	28	-	-	-	-
Radykalne	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	164	74,4%	75,6%	68,6%	82,5%
2-letnie	122	56,1%	57,9%	49,9%	65,9%
3-letnie	92	47,2%	49,6%	41,2%	57,9%

*Mała liczba przypadków, niska wiarygodność wyników

Paliatywne	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	463	24,6%	25,1%	21,0%	29,2%
2-letnie	114	8,0%	8,3%	5,7%	10,9%
3-letnie	37	4,3%	4,5%	2,5%	6,6%

Paliatywne	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	166	33%	33%	26%	40%
2-letnie	54	11%	11%	6%	16%
3-letnie	18	5%	5%	1%	9%
Paliatywne	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	629	26,7%	27,2%	23,6%	30,8%
2-letnie	168	8,7%	9,1%	6,7%	11,4%
3-letnie	55	4,4%	4,7%	2,9%	6,5%

Objawowe	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	253	13,8%	14,1%	9,7%	18,6%
2-letnie	35	3,2%	3,3%	1,0%	5,6%
3-letnie	8	2,4%	2,5%	0,5%	4,6%
Objawowe	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	92	15,2%	15,5%	7,9%	23,1%
2-letnie	14	4,3%	4,5%	0,1%	8,9%
3-letnie	4	4,3%	4,6%	0,1%	9,0%
Objawowe	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	345	14,2%	14,5%	10,7%	18,3%
2-letnie	49	3,5%	3,6%	1,6%	5,7%
3-letnie	12	2,9%	3,1%	1,2%	5,0%

Skierowany na leczenie	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	308	39,6%	40,4%	34,7%	46,1%
2-letnie	122	23,1%	24,0%	19,0%	29,0%
3-letnie	71	17,6%	18,7%	14,0%	23,4%
Skierowany na leczenie	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	95	-	-	-	-
2-letnie	54	-	-	-	-
3-letnie	39	-	-	-	-
Skierowany na leczenie	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	403	43,7%	44,5%	39,4%	49,5%
2-letnie	176	27,3%	28,3%	23,7%	32,9%
3-letnie	110	21,8%	23,0%	18,6%	27,4%

*Mała liczba przypadków, niska wiarygodność wyników

Brak danych	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	604	45,9%	46,7%	42,6%	50,9%
2-letnie	277	28,0%	29,1%	25,3%	32,9%
3-letnie	169	21,7%	23,0%	19,4%	26,7%
Brak danych	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	219	53,9%	54,5%	47,7%	61,3%
2-letnie	118	37,4%	38,3%	31,6%	45,0%
3-letnie	82	29,6%	30,7%	24,1%	37,3%
Brak danych	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	823	48,0%	48,8%	45,3%	52,4%
2-letnie	395	30,5%	31,6%	28,3%	34,9%
3-letnie	251	23,8%	25,1%	21,9%	28,3%

Tabela 5.56

1-roczone, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w województwie świętokrzyskim w zależności od typu leczenia

Skojarzone	Mężczyźni*				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	85	-	-	-	-
2-letnie	43	-	-	-	-
3-letnie	21	-	-	-	-
Skojarzone	Kobiety*				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	22	-	-	-	-
2-letnie	15	-	-	-	-
3-letnie	11	-	-	-	-
Skojarzone	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	107	54,2%	55,0%	45,3%	64,8%
2-letnie	58	29,9%	30,9%	21,7%	40,0%
3-letnie	32	23,7%	24,9%	16,1%	33,6%

*Mała liczba przypadków, niska wiarygodność wyników

Nieskojarzone	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	1132	39,9%	40,7%	37,7%	43,7%
2-letnie	452	21,9%	22,8%	20,2%	25,3%
3-letnie	248	15,8%	16,8%	14,4%	19,1%

Nieskojarzone	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	427	46,6%	47,1%	42,3%	52,0%
2-letnie	199	25,5%	26,1%	21,8%	30,5%
3-letnie	109	18,9%	19,6%	15,6%	23,7%
Nieskojarzone	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	1559	41,8%	42,5%	39,9%	45,0%
2-letnie	651	22,9%	23,7%	21,5%	25,9%
3-letnie	357	16,7%	17,6%	15,5%	19,6%

Brak danych	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	546	25,5%	26,0%	22,2%	29,8%
2-letnie	139	14,7%	15,3%	12,1%	18,4%
3-letnie	80	12,3%	13,1%	10,0%	16,1%
Brak danych	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	175	37,7%	38,3%	30,9%	45,7%
2-letnie	66	29,7%	30,7%	23,5%	37,8%
3-letnie	52	27,7%	29,0%	21,9%	36,2%
Brak danych	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	721	28,4%	29,0%	25,6%	32,4%
2-letnie	205	18,3%	19,0%	16,0%	22,0%
3-letnie	132	16,0%	17,0%	14,0%	19,9%

Tabela 5.57

1-roczone, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w województwie warmińsko-mazurskim

	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	2019	36,4%	37,1%	35,0%	39,3%
2-letnie	735	21,6%	22,5%	20,6%	24,4%
3-letnie	434	15,9%	16,9%	15,1%	18,6%
	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	1081	46,3%	46,9%	43,9%	50,0%
2-letnie	501	30,0%	30,7%	27,9%	33,6%
3-letnie	323	23,3%	24,2%	21,5%	27,0%
	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	3100	39,9%	40,6%	38,8%	42,4%
2-letnie	1236	24,5%	25,4%	23,8%	27,0%
3-letnie	757	18,4%	19,5%	18,0%	21,0%

Tabela 5.58

1-letnie, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w województwie warmińsko-mazurskim w zależności od stadium zaawansowania

Stadium miejscowe	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	449	60,1%	61,4%	56,7%	66,1%
2-letnie	270	43,4%	45,2%	40,4%	50,1%
3-letnie	194	36,4%	38,7%	33,8%	43,7%
Stadium miejscowe	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	263	71,9%	72,7%	67,1%	78,4%
2-letnie	189	57,8%	59,3%	53,0%	65,5%
3-letnie	152	48,0%	49,9%	43,2%	56,5%
Stadium miejscowe	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	712	64%	66%	62%	69%
2-letnie	459	49%	50%	47%	54%
3-letnie	346	41%	43%	39%	47%

Stadium regionalne	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	477	46,5%	47,5%	42,8%	52,1%
2-letnie	222	27,0%	28,1%	23,9%	32,4%
3-letnie	128	17,2%	18,2%	14,5%	22,0%
Stadium regionalne	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	254	50,4%	51,1%	44,7%	57,4%
2-letnie	128	31,0%	31,9%	25,9%	37,9%
3-letnie	78	21,6%	22,5%	16,9%	28,1%
Stadium regionalne	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	731	47,9%	48,7%	45,0%	52,5%
2-letnie	350	28,4%	29,4%	26,0%	32,9%
3-letnie	206	18,7%	19,7%	16,6%	22,9%

Stadium uogólnione	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	751	19,4%	19,8%	16,9%	22,8%
2-letnie	146	6,7%	6,9%	5,0%	8,8%
3-letnie	50	3,7%	3,9%	2,4%	5,4%

Stadium uogólnione	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	387	26,9%	27,2%	22,6%	31,7%
2-letnie	104	10,3%	10,6%	7,4%	13,8%
3-letnie	40	6,0%	6,2%	3,6%	8,8%
Stadium uogólnione	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	1138	22,0%	22,3%	19,8%	24,8%
2-letnie	250	7,9%	8,2%	6,5%	9,8%
3-letnie	90	4,5%	4,7%	3,4%	6,0%

Brak danych	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	342	28,4%	29,0%	24,0%	33,9%
2-letnie	97	18,1%	18,9%	14,6%	23,3%
3-letnie	62	14,1%	15,0%	11,0%	19,0%
Brak danych	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	177	45,2%	45,9%	38,3%	53,5%
2-letnie	80	29,9%	30,9%	23,8%	37,9%
3-letnie	53	26,9%	28,1%	21,1%	35,2%
Brak danych	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	519	34,1%	34,7%	30,5%	39,0%
2-letnie	177	22,2%	23,0%	19,2%	26,8%
3-letnie	115	18,4%	19,5%	15,9%	23,2%

Tabela 5.59

1-roczone, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w województwie warmińsko-mazurskim w zależności od rodzaju leczenia

Radykalne	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	343	63,6%	64,8%	61,8%	67,7%
2-letnie	218	44,9%	46,7%	44,8%	48,6%
3-letnie	154	34,8%	36,9%	35,4%	38,5%
Radykalne	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	176	69,9%	70,6%	63,6%	77,6%
2-letnie	123	54,0%	55,1%	47,4%	62,8%
3-letnie	95	44,5%	45,9%	37,9%	53,9%
Radykalne	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	519	65,7%	66,8%	62,5%	71,0%
2-letnie	341	48,0%	49,6%	45,0%	54,1%
3-letnie	249	38,1%	40,0%	35,4%	44,6%

Paliatywne	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	346	19,9%	20,4%	16,0%	24,8%
2-letnie	69	7,7%	8,1%	5,0%	11,1%
3-letnie	26	3,2%	3,4%	1,3%	5,5%
Paliatywne	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	152	22%	23%	16%	30%
2-letnie	34	7%	7%	3%	12%
3-letnie	11	4%	4%	1%	8%
Paliatywne	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	498	20,7%	21,1%	17,4%	24,8%
2-letnie	103	7,6%	7,9%	5,4%	10,3%
3-letnie	37	3,4%	3,6%	1,8%	5,5%

Objawowe	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	223	13,5%	13,8%	9,1%	18,4%
2-letnie	30	5,8%	6,1%	2,8%	9,4%
3-letnie	13	1,8%	1,9%	-0,1%	3,9%
Objawowe	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	103	16,5%	16,8%	9,3%	24,2%
2-letnie	17	9,7%	10,0%	4,0%	16,1%
3-letnie	10	6,5%	6,8%	1,6%	12,0%
Objawowe	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	326	14,4%	14,7%	10,7%	18,7%
2-letnie	47	7,1%	7,4%	4,4%	10,3%
3-letnie	23	3,3%	3,5%	1,3%	5,6%

Skierowany na leczenie	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	861	39,8%	40,6%	37,2%	44,0%
2-letnie	343	23,1%	24,0%	21,0%	27,0%
3-letnie	198	17,2%	18,3%	15,5%	21,1%
Skierowany na leczenie	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	502	51,8%	52,4%	47,9%	56,9%
2-letnie	260	31,6%	32,4%	28,1%	36,6%
3-letnie	158	23,3%	24,2%	20,1%	28,2%
Obie płcie					

Skierowany na leczenie	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	1363	44,2%	45,0%	42,2%	47,7%
2-letnie	603	26,2%	27,1%	24,7%	29,6%
3-letnie	356	19,5%	20,5%	18,2%	22,8%

Brak danych	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	233	32,2%	32,9%	26,6%	39,1%
2-letnie	75	18,5%	19,2%	13,9%	24,5%
3-letnie	43	16,1%	17,1%	11,9%	22,3%
Brak danych	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	138	47,1%	47,8%	39,1%	56,4%
2-letnie	65	34,1%	35,0%	26,7%	43,3%
3-letnie	47	31,4%	32,8%	24,4%	41,1%
Brak danych	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	371	37,7%	38,4%	33,3%	43,5%
2-letnie	140	24,3%	25,2%	20,5%	29,8%
3-letnie	90	21,7%	23,0%	18,4%	27,5%

Tabela 5.60

1-letnie, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w województwie warmińsko-mazurskim w zależności od typu leczenia

Skojarzone	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	120	57,5%	58,5%	49,3%	67,7%
2-letnie	69	29,2%	30,2%	21,6%	38,8%
3-letnie	35	19,8%	20,9%	13,0%	28,8%
Skojarzone	Kobiety*				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	75	-	-	-	-
2-letnie	35	-	-	-	-
3-letnie	25	-	-	-	-
Skojarzone	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	195	53,3%	54,1%	46,8%	61,3%
2-letnie	104	30,8%	31,7%	24,9%	38,5%
3-letnie	60	22,3%	23,3%	17,0%	29,7%

*Mała liczba przypadków, niska wiarygodność wyników

Nieskojarzone	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	1190	42,0%	42,9%	39,9%	45,8%
2-letnie	500	24,9%	26,0%	23,4%	28,6%
3-letnie	296	17,8%	18,9%	16,5%	21,3%
Nieskojarzone	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	634	51,3%	51,8%	47,8%	55,9%
2-letnie	325	31,2%	32,0%	28,2%	35,7%
3-letnie	198	22,9%	23,7%	20,1%	27,3%
Nieskojarzone	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	1824	45,2%	46,0%	43,6%	48,4%
2-letnie	825	27,1%	28,1%	25,9%	30,2%
3-letnie	494	19,6%	20,6%	18,6%	22,6%

Brak danych	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	709	23,4%	23,9%	20,7%	27,2%
2-letnie	166	14,6%	15,3%	12,5%	18,1%
3-letnie	103	12,0%	12,8%	10,1%	15,4%
Brak danych	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	372	37,9%	38,5%	33,4%	43,6%
2-letnie	141	27,1%	28,0%	23,2%	32,7%
3-letnie	100	23,5%	24,6%	19,9%	29,3%
Brak danych	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	1081	28,4%	29,0%	26,2%	31,7%
2-letnie	307	18,9%	19,7%	17,2%	22,2%
3-letnie	203	15,9%	16,9%	14,5%	19,3%

Tabela 5.61

1-roczone, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w województwie wielkopolskim

	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	4056	36,8%	37,5%	36,0%	39,1%
2-letnie	1492	19,8%	20,6%	19,3%	21,9%
3-letnie	803	13,6%	14,4%	13,2%	15,6%

	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	2097	41,7%	42,3%	40,1%	44,5%
2-letnie	875	24,1%	24,7%	22,8%	26,7%
3-letnie	505	18,6%	19,4%	17,6%	21,3%
	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	6153	38,5%	39,1%	37,9%	40,4%
2-letnie	2367	21,3%	22,0%	20,9%	23,1%
3-letnie	1308	15,3%	16,1%	15,1%	17,1%

Tabela 5.62

1-roczone, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w województwie wielkopolskim w zależności od stadium zaawansowania

Stadium miejscowe	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	420	73,3%	74,8%	70,4%	79,2%
2-letnie	308	56,0%	58,3%	53,3%	63,4%
3-letnie	235	44,9%	47,8%	42,5%	53,1%
Stadium miejscowe	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	223	79,8%	80,9%	75,4%	86,3%
2-letnie	178	66,8%	68,6%	62,1%	75,1%
3-letnie	149	55,5%	57,9%	50,7%	65,1%
Stadium miejscowe	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	643	76%	77%	73%	80%
2-letnie	486	60%	62%	58%	66%
3-letnie	384	49%	51%	47%	56%

Stadium regionalne	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	988	53,0%	54,0%	50,8%	57,3%
2-letnie	524	27,3%	28,4%	25,5%	31,3%
3-letnie	270	18,9%	20,0%	17,3%	22,7%
Stadium regionalne	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	473	52,0%	52,6%	48,0%	57,3%
2-letnie	246	30,0%	30,8%	26,4%	35,1%
3-letnie	142	22,5%	23,3%	19,2%	27,4%

Stadium regionalne	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	1461	52,7%	53,6%	50,9%	56,2%
2-letnie	770	28,2%	29,2%	26,7%	31,6%
3-letnie	412	20,0%	21,1%	18,8%	23,4%

Stadium uogólnione	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	2023	21,8%	22,3%	20,4%	24,2%
2-letnie	442	7,3%	7,6%	6,4%	8,8%
3-letnie	147	2,9%	3,1%	2,3%	3,9%
Stadium uogólnione	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	1053	26,9%	27,2%	24,5%	30,0%
2-letnie	283	9,2%	9,5%	7,6%	11,3%
3-letnie	97	5,8%	6,1%	4,5%	7,6%
Stadium uogólnione	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	3076	23,6%	24,0%	22,4%	25,5%
2-letnie	725	7,9%	8,2%	7,2%	9,2%
3-letnie	244	3,9%	4,1%	3,3%	4,9%

Brak danych	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	625	34,9%	35,6%	31,7%	39,5%
2-letnie	218	24,2%	25,2%	21,6%	28,7%
3-letnie	151	19,3%	20,5%	17,1%	24,0%
Brak danych	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	348	48,3%	49,1%	43,6%	54,5%
2-letnie	168	33,6%	34,7%	29,5%	40,0%
3-letnie	117	28,8%	30,2%	25,0%	35,5%
Brak danych	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	973	39,7%	40,4%	37,2%	43,6%
2-letnie	386	27,5%	28,6%	25,6%	31,6%
3-letnie	268	22,7%	24,0%	21,1%	27,0%

Tabela 5.63

1-letnie, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w województwie wielkopolskim w zależności od rodzaju leczenia

Radykalne	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	665	75,9%	77,4%	75,5%	79,2%
2-letnie	505	51,0%	53,0%	51,8%	54,2%
3-letnie	339	37,3%	39,5%	38,7%	40,3%
Radykalne	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	351	78,9%	79,7%	75,3%	84,1%
2-letnie	277	57,8%	59,1%	53,7%	64,5%
3-letnie	203	45,3%	46,8%	41,1%	52,6%
Radykalne	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	1016	77,0%	78,2%	75,5%	80,9%
2-letnie	782	53,3%	55,1%	51,9%	58,3%
3-letnie	542	40,0%	42,1%	38,7%	45,4%

Paliatywne	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	1450	31,3%	31,9%	29,4%	34,4%
2-letnie	454	10,0%	10,4%	8,8%	12,0%
3-letnie	145	4,2%	4,5%	3,3%	5,6%
Paliatywne	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	788	35%	36%	32%	39%
2-letnie	278	12%	12%	10%	14%
3-letnie	93	7%	7%	5%	9%
Paliatywne	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	2238	32,7%	33,2%	31,2%	35,3%
2-letnie	732	10,6%	11,0%	9,6%	12,3%
3-letnie	238	5,2%	5,5%	4,5%	6,5%

Objawowe	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	903	10,7%	11,0%	8,9%	13,1%
2-letnie	97	4,2%	4,4%	3,0%	5,8%
3-letnie	38	2,5%	2,6%	1,5%	3,7%

Objawowe	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	432	12,7%	13,0%	9,7%	16,2%
2-letnie	55	7,6%	7,9%	5,3%	10,6%
3-letnie	33	5,8%	6,1%	3,7%	8,5%
Objawowe	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	1335	11,4%	11,6%	9,8%	13,4%
2-letnie	152	5,3%	5,5%	4,3%	6,8%
3-letnie	71	3,5%	3,7%	2,6%	4,8%

Skierowany na leczenie	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	694	40,8%	41,6%	37,8%	45,4%
2-letnie	283	27,2%	28,4%	24,8%	31,9%
3-letnie	189	22,6%	24,0%	20,6%	27,5%
Skierowany na leczenie	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	353	48,7%	49,4%	44,0%	54,8%
2-letnie	172	33,1%	34,1%	28,9%	39,2%
3-letnie	117	28,2%	29,4%	24,3%	34,6%
Skierowany na leczenie	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	1047	43,5%	44,2%	41,1%	47,4%
2-letnie	455	29,2%	30,3%	27,4%	33,2%
3-letnie	306	24,5%	25,9%	23,0%	28,7%

Brak danych	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	321	46,1%	46,9%	41,3%	52,6%
2-letnie	148	28,0%	29,1%	23,9%	34,3%
3-letnie	90	20,1%	21,2%	16,4%	26,1%
Brak danych	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	160	55,6%	56,3%	48,4%	64,3%
2-letnie	89	35,0%	35,9%	28,2%	43,7%
3-letnie	56	32,1%	33,4%	25,7%	41,2%
Brak danych	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	481	49,3%	50,1%	45,4%	54,7%
2-letnie	237	30,4%	31,4%	27,0%	35,7%
3-letnie	146	24,1%	25,3%	21,2%	29,5%

Tabela 5.64

1-letnie, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w województwie wielkopolskim w zależności od typu leczenia

Skojarzone	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	197	51,8%	52,7%	45,5%	59,9%
2-letnie	102	27,4%	28,4%	21,8%	35,0%
3-letnie	54	16,0%	16,9%	11,1%	22,6%
Skojarzone	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	104	-	-	-	-
2-letnie	60	-	-	-	-
3-letnie	35	-	-	-	-
Skojarzone	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	301	53,8%	54,6%	48,8%	60,5%
2-letnie	162	29,6%	30,5%	25,1%	35,9%
3-letnie	89	20,3%	21,3%	16,2%	26,4%

*Mała liczba przypadków, niska wiarygodność wyników

Nieskojarzone	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	2369	42,6%	43,4%	41,4%	45,5%
2-letnie	1010	21,2%	22,0%	20,3%	23,8%
3-letnie	502	13,6%	14,5%	12,9%	16,0%
Nieskojarzone	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	1264	45,6%	46,1%	43,3%	48,9%
2-letnie	576	24,1%	24,7%	22,3%	27,2%
3-letnie	305	17,7%	18,3%	16,0%	20,6%
Nieskojarzone	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	3633	43,7%	44,4%	42,7%	46,0%
2-letnie	1586	22,2%	23,0%	21,5%	24,4%
3-letnie	807	15,0%	15,8%	14,5%	17,1%

Brak danych	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-letnie	1490	25,5%	26,0%	23,7%	28,3%
2-letnie	380	16,6%	17,3%	15,3%	19,3%
3-letnie	247	13,2%	14,1%	12,2%	16,0%

Brak danych	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	729	32,8%	33,3%	29,8%	36,8%
2-letnie	239	22,6%	23,4%	20,2%	26,6%
3-letnie	165	19,0%	19,9%	16,8%	23,0%
Brak danych	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	2219	27,9%	28,4%	26,5%	30,4%
2-letnie	619	18,6%	19,3%	17,6%	21,0%
3-letnie	412	15,1%	16,0%	14,4%	17,7%

Tabela 5.65

1-roczone, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w województwie zachodniopomorskim

	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	2195	36,4%	37,1%	35,0%	39,2%
2-letnie	798	21,3%	22,2%	20,4%	24,0%
3-letnie	468	15,9%	16,9%	15,2%	18,7%
	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	1284	44,2%	44,8%	42,0%	47,6%
2-letnie	568	28,3%	29,1%	26,5%	31,7%
3-letnie	364	22,4%	23,3%	20,9%	25,8%
	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	3479	39,3%	39,9%	38,3%	41,6%
2-letnie	1366	23,9%	24,8%	23,3%	26,3%
3-letnie	832	18,3%	19,3%	17,9%	20,8%

Tabela 5.66

1-roczone, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w województwie zachodniopomorskim w zależności od stadium zaawansowania

Stadium miejscowe	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	275	71,3%	72,7%	67,2%	78,3%
2-letnie	196	56,7%	59,1%	52,9%	65,4%
3-letnie	156	47,5%	50,6%	44,0%	57,2%
Stadium miejscowe	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	163	81,0%	81,9%	75,7%	88,1%
2-letnie	132	70,6%	72,3%	64,9%	79,6%
3-letnie	115	60,2%	62,5%	54,1%	70,8%

Stadium miejscowe	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	438	75%	76%	72%	80%
2-letnie	328	62%	64%	59%	69%
3-letnie	271	52%	55%	50%	60%

Stadium regionalne	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	430	39,3%	40,1%	35,3%	44,9%
2-letnie	169	21,6%	22,5%	18,4%	26,6%
3-letnie	93	16,6%	17,7%	13,7%	21,6%
Stadium regionalne	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	232	53,9%	54,5%	47,9%	61,1%
2-letnie	125	31,5%	32,2%	26,0%	38,5%
3-letnie	73	22,3%	23,2%	17,3%	29,1%
Stadium regionalne	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	662	44,4%	45,2%	41,2%	49,1%
2-letnie	294	25,1%	26,0%	22,5%	29,4%
3-letnie	166	18,6%	19,6%	16,3%	22,9%

Stadium uogólnione	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	708	21,0%	21,4%	18,3%	24,6%
2-letnie	149	5,7%	5,9%	4,1%	7,7%
3-letnie	40	2,5%	2,6%	1,3%	3,9%
Stadium uogólnione	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	431	24,8%	25,1%	20,9%	29,4%
2-letnie	107	9,3%	9,5%	6,7%	12,4%
3-letnie	40	6,1%	6,3%	3,8%	8,8%
Stadium uogólnione	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	1139	22,5%	22,8%	20,3%	25,4%
2-letnie	256	7,0%	7,3%	5,7%	8,8%
3-letnie	80	3,8%	4,0%	2,8%	5,2%

Brak danych	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	782	36,3%	37,1%	33,6%	40,6%
2-letnie	284	22,9%	23,9%	20,7%	27,0%
3-letnie	179	16,8%	17,9%	15,0%	20,8%

Brak danych	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	458	44,5%	45,2%	40,5%	49,9%
2-letnie	204	29,7%	30,6%	26,2%	35,0%
3-letnie	136	24,6%	25,7%	21,4%	30,0%
Brak danych	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	1240	39,4%	40,1%	37,2%	42,9%
2-letnie	488	25,4%	26,4%	23,8%	28,9%
3-letnie	315	19,6%	20,8%	18,3%	23,2%

Tabela 5.67

1-roczone, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w województwie zachodniopomorskim w zależności od rodzaju leczenia

Radykalne	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	386	71,2%	72,6%	69,5%	75,7%
2-letnie	275	53,9%	56,0%	54,2%	57,8%
3-letnie	208	42,0%	44,6%	43,3%	45,9%
Radykalne	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	232	84,1%	85,0%	80,1%	89,8%
2-letnie	195	69,8%	71,4%	65,2%	77,6%
3-letnie	162	61,6%	63,7%	56,9%	70,5%
Radykalne	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	618	76,1%	77,3%	73,8%	80,8%
2-letnie	470	59,9%	61,8%	57,8%	65,9%
3-letnie	370	49,4%	51,9%	47,5%	56,2%

Paliatywne	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	606	28,7%	29,3%	25,5%	33,0%
2-letnie	174	11,1%	11,5%	8,9%	14,2%
3-letnie	67	5,4%	5,7%	3,7%	7,7%
Paliatywne	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	356	32%	32%	27%	37%
2-letnie	114	13%	14%	10%	18%
3-letnie	48	8%	8%	5%	11%
Paliatywne	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	962	29,9%	30,5%	27,4%	33,5%
2-letnie	288	12,0%	12,4%	10,2%	14,5%
3-letnie	115	6,2%	6,5%	4,8%	8,2%

Objawowe	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	172	13,4%	13,6%	8,4%	18,9%
2-letnie	23	8,7%	9,1%	4,6%	13,6%
3-letnie	15	6,1%	6,5%	2,6%	10,5%
Objawowe	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	125	16,0%	16,3%	9,6%	23,0%
2-letnie	20	4,0%	4,1%	0,5%	7,8%
3-letnie	5	3,2%	3,4%	0,1%	6,7%
Objawowe	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	297	14,5%	14,8%	10,6%	18,9%
2-letnie	43	6,7%	7,0%	4,0%	10,0%
3-letnie	20	4,9%	5,2%	2,5%	7,9%

Skierowany na leczenie	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	815	33,0%	33,7%	30,3%	37,0%
2-letnie	269	17,7%	18,4%	15,6%	21,2%
3-letnie	144	14,7%	15,7%	13,0%	18,4%
Skierowany na leczenie	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	446	40,6%	41,1%	36,4%	45,8%
2-letnie	181	24,4%	25,1%	20,9%	29,3%
3-letnie	109	18,8%	19,5%	15,6%	23,5%
Skierowany na leczenie	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	1261	35,7%	36,3%	33,6%	39,1%
2-letnie	450	20,1%	20,8%	18,4%	23,1%
3-letnie	253	16,2%	17,1%	14,8%	19,3%

Brak danych	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	207	26,1%	26,6%	20,4%	32,8%
2-letnie	54	15,9%	16,6%	11,3%	21,9%
3-letnie	33	11,6%	12,3%	7,3%	17,4%
Brak danych	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	120	48,3%	49,0%	39,8%	58,3%
2-letnie	58	33,3%	34,3%	25,5%	43,2%
3-letnie	40	25,3%	26,5%	17,7%	35,3%

Brak danych	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	327	34,3%	34,9%	29,5%	40,2%
2-letnie	112	22,3%	23,2%	18,4%	27,9%
3-letnie	73	16,6%	17,6%	13,0%	22,2%

Tabela 5.68

1-roczone, 2-letnie, 3-letnie wskaźniki przeżyć względnych chorych na raka płuca w województwie zachodniopomorskim w zależności od typu leczenia

Skojarzone	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	250	56,0%	57,0%	50,6%	63,4%
2-letnie	140	33,2%	34,5%	28,3%	40,7%
3-letnie	83	26,6%	28,2%	22,1%	34,3%
Skojarzone	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	130	66,2%	66,9%	58,5%	75,2%
2-letnie	86	48,5%	49,5%	40,6%	58,5%
3-letnie	63	38,8%	40,1%	30,7%	49,5%
Skojarzone	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	380	59,5%	60,4%	55,3%	65,5%
2-letnie	226	38,4%	39,7%	34,5%	44,8%
3-letnie	146	30,8%	32,3%	27,1%	37,5%

Nieskojarzone	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	1175	36,0%	36,7%	33,9%	39,6%
2-letnie	423	20,7%	21,5%	19,1%	24,0%
3-letnie	243	14,1%	15,0%	12,8%	17,2%
Nieskojarzone	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	721	43,7%	44,3%	40,5%	48,0%
2-letnie	315	27,5%	28,2%	24,8%	31,6%
3-letnie	198	21,8%	22,7%	19,5%	26,0%
Nieskojarzone	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	1896	38,9%	39,6%	37,3%	41,9%
2-letnie	738	23,3%	24,1%	22,1%	26,1%
3-letnie	441	17,0%	18,0%	16,1%	19,8%

Brak danych	Mężczyźni				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	770	30,5%	31,1%	27,8%	34,5%
2-letnie	235	18,4%	19,2%	16,3%	22,1%
3-letnie	142	15,6%	16,6%	13,8%	19,5%
Brak danych	Kobiety				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	433	38,6%	39,1%	34,3%	43,8%
2-letnie	167	23,8%	24,4%	20,2%	28,7%
3-letnie	103	18,5%	19,3%	15,3%	23,4%
Brak danych	Obie płcie				
	Liczba	obserwowane	względne	95% CI	
1-roczone	1203	33,4%	34,0%	31,2%	36,8%
2-letnie	402	20,4%	21,1%	18,7%	23,5%
3-letnie	245	16,7%	17,6%	15,3%	20,0%